



Num. 399. Publicado el 19/11/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Boletus impolitus*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 399. Publicado el 19/11/2012

Descripciones de especies

Vinca major L.

Hierba perenne, rizomatosa, estolonífera. Hojas 21-107 x 17-76 mm, opuestas tanto en los tallos fértiles como en los estériles, de casi orbiculares en...

Vive en sotobosques húmedos y cauces fluviales, desde el nivel del mar a los 1200(1800) m de altitud....

Nativa del C de la región mediterránea. Dispersa por la Península Ibérica y rara en el S, como adventicia o naturalizada....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vinca-major.html>

Saxifraga tridactylites L.

Planta anual, muy pequeña y delicada -de (2)5-10(30) cm-, sin rosetas durante la floración, en ocasiones completamente purpúrea, viscosa, con indumen...

Vive en suelos arenosos y resacas de roquedales, en substrato básico -a veces en suelos arenosos silíceos-, desde los (300)500 a los 1400(2150) m....

Aparece en Eurasia y África mediterránea. En la mayor parte de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-tridactylites.html>

Ranunculus paludosus Poir.

Planta vivaz de 10 - 50 cm, con estolones, con una cepa muy engrosada, rodeada de restos fibrosos, raíces tuberosas abundantes, pequeñas, entremezcl...

Crece en pastos secos sobre suelo arenoso, pedregoso o yesoso, tanto en terrenos silíceos como calizos, o pastos en suelos temporalmente húmedos desde...

Aparece en la región mediterránea, O de Europa. En la Península parece en la mayor parte de la Península y en Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-paludosus.html>

Hygrocybe insipida (J. E. Lange ex S. Lundell) M. M. Moser

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 3 a 25 mm de diámetro, de hemisféricos a aplanados, en ocasiones con el centro deprimido y el margen más o ...



Crece en prados y zonas no fertilizadas como dunas fijas y suelos ricos, también en bosques caducifolios y zonas de matorrales....

Aparece por toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-insipida.html>

Boletus fragrans Vittad.

Macroscopía. Sombrero convexo, regular o más o menos giboso y puede llegar a tener grandes dimensiones (hasta 165 mm). Revestimiento tomentoso, seco, ...

Este hongo forma micorrizas con árboles planifolios tales como Castanea y Quercus en suelos preferentemente ácidos. Posee apetencias termófilas y habi...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boletus-fragrans.html>

Novedades corológicas

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Riofabar, Piloña. ASTURIAS el día 12/11/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hericium-erinaceus-bull-pers-1/14318.html>

Lactarius deterrimus Gröger (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Latores, Oviedo. ASTURIAS el día 14/11/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//14336.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus porphyrizon P. D. Orton (Basidiomycota)

Boletus impolitus Fr. (Basidiomycota)

Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W. Phillips (Ascomycota)

Lactarius deterrimus Gröger (Basidiomycota)

Mycena olivaceomarginata (Masse) Masee (Basidiomycota)



Russula delica Fr. (Basidiomycota)

Russula odorata Romagn. (Basidiomycota)

Thalassema neptuni Gaertner (Echiura)

