



## Num. 40. Publicado el 12/09/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Cortinarius subcotoneus*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 40. Publicado el 12/09/2005**

## Descripciones de especies

*Umbraulva olivascens* (Dangeard) Bae & Lee

Talo verde laminar, foliáceo, grueso, lobulado, formado por 2 capas de células y fijado al sustrato por rizoides que crecen como expansiones de las cé...

En rocas, construcciones portuarias, lugares generalmente sombreados....

Desde las Islas Británicas a Marruecos y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/umbraulva-olivascens.html>

*Ulva rigida* Agardh

Talo verde laminar, foliáceo, lobulado, formado por 2 capas de células y fijado al sustrato por rizoides que crecen como expansiones de las células ba...

En rocas, piedras, construcciones portuarias, en otras algas o sobre conchas de moluscos....

Presente en casi todos los mares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ulva-rigida.html>

*Tubulanus annulatus* (Montagu, 1804)

Gusano de unos 12 cm de longitud, a veces llega a 75 cm y con 3 - 4 mm de diámetro, aunque suele ser más grueso al estar más contraído; aplanado ventr...

Bajo rocas, piedras, en arena, en rizoides de kelps en el intermareal, y también en conchas de moluscos en el submareal....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tubulanus-annulatus.html>

*Sepiolo atlantica* Orbigny, 1840

Molusco cefalópodo de cuerpo corto, en forma de saco, de unos 2 - 5 cm de longitud, midiendo el manto unos 2. Las aletas son finas, cortas, irregularm...



Nada sobre la arena generalmente, a veces se encuentra en charcas de marea, hasta unos 100 m....

Desde Noruega al norte de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sepiola-atlantica.html>

## *Poseidon ruber* (Müller, 1774)

Gusano alargado y ligeramente aplanado, que suele alcanzar hasta 8 cm de longitud, pero algunos alcanzan hasta los 16 y 3-4 mm de ancho. Cabeza ligera...

Se puede encontrar en el piso intermareal entre arena y fango, debajo de cantos y piedras, o entre rizomas de algas o el viso de mejillones. También s...

Distribución circumpolar en el hemisferio norte: costas del norte de Europa, costas europeas Océano Atlántico, ambas costas norteamericanas y en el Ma...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/poseidon-ruber.html>

## *Molgula manhattensis* (DeKay, 1843)

Ascidia solitaria, de cuerpo redondeado de 1 a 3 cm de altura. El sifón oral tiene 6 lóbulos y el atrial 4; ambos están situados en posición terminal,...

Hasta 90 o 100 m de profundidad, sobre rocas, algas o construcciones marinas. También se encuentra en estuarios....

Desde Noruega al Mediterráneo y Sahara. También en la costa NE de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/molgula-manhattensis.html>

## *Marphysa sanguinea* (Montagu, 1815)

Gusano de cuerpo ancho, aplanado, hasta 60 cm de longitud. Tiene 300 segmentos o más. La cabeza tiene 5 antenas cortas de igual longitud. Los cirros d...

En arena, en grietas de rocas o entre algas....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/marphysa-sanguinea.html>

## *Marphysa belli* (Audouin y Edwards, 1833)



Gusano de hasta 20 cm de longitud, de cuerpo delgado, formado por 200 - 300 segmentos. La cabeza tiene 5 antenas débilmente anilladas de igual longitu...

Enterrado en arena o fango....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/marphysa-belli.html>

## *Antalis vulgaris* (Da Costa, 1778)

Concha tubular, bastante curvadae, de hasta unos 35 mm de longitud, de color amarillento o blanquecino. Está abierta por los 2 extremos, siendo el más...

Usa el pie para excavar en fondos fangosos o arenosos, enterrándose verticalmente, pero dejando libre el extremo más delgado, por donde pasan las corr...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/antalis-vulgaris.html>

## *Amphiporus lactifloreus* (Johnston, 1828)

Gusano de unos 8 cm de longitud y 1 - 3 mm de diámetro, con la zona ventral aplanada y la dorsal redondeada, de cola roma. Cabeza ancha, ovalada, con ...

Vive en arena o grava desde la zona de Pelvetia hasta 250 m de profundidad, donde se encuentra asociada a kelps....

Desde Noruega al Mediterráneo, también en la costa atlántica americana....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amphiporus-lactifloreus.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Calothrix crustacea* (Cyanophyta)

*Chelon labrosus* (Risso, 1827) (Chordata)

*Lepadogaster candolii* Risso, 1810 (Chordata)



*Parerythropodium coralloides* (Cnidaria)

*Processa canaliculata* (Arthropoda)

## **Artículos**

**Las anémonas, corales, medusas e hidrozooos; los Cnidarios y los Ctenóforos**

Por Menéndez Valderrey, J.L. & Lorenzo Corchón, A.

