



## Num. 400. Publicado el 26/11/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Boletus impolitus*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 400. Publicado el 26/11/2012**

## Descripciones de especies

*Typhula spathulata* (Peck) Berthier

Macroscopía. Hongo que forma pequeñas clavulas blancas y más o menos fusiformes, clavadas, atenuadas o comprimidas, de hasta 5 mm de altura, de consis...

En hojas de árboles caducifolios....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/typhula-spathulata.html>

*Palliolum striatum* (O. F. Müller, 1776)

Pequeño pectínido, de no más de 20 milímetros de diámetro y forma casi circular (apenas más alto que ancho), con valvas exteriormente algo convexas, f...

Vive sobre sustratos mixtos y variados: desde arenas gravosas a fondos duros (de cascajo de conchas, rocas, etcétera), pero siempre a una cierta profu...

Desde el sur de Islandia y el norte de Noruega hasta la Península Ibérica y el Mediterráneo occidental....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos y MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/palliolum-striatum.html>

*Orobanche alba* Stephan ex Willd.

Planta parásita anual o perenne, con tallos simples de hasta 30 (50) cm de altura, de color rosa o rojo oscuro, con pelos glandulíferos. Las hojas, qu...

Este rabo de lobo parasita diversas plantas de la familia Labiatae, especialmente los tomillos (*Thymus*), en zonas rocosas y calcáreas por lo general, ...

Aparece en la mayor parte de Europa y en el oeste de Asia, alcanzando el Himalaya hacia el este. En la Península aparece en casi todo el territorio, e...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-alba.html>

*Oenanthe crocata* L.

Hierba perenne con raíces tuberosas hasta de 10 x 1,5 cm, cilíndrico-obovoides, netamente separadas de la base del tallo y tallos en general hasta



de...

Oenanthe crocata crece en los márgenes de cursos de agua, acequias y lugares húmedos en general, desde el nivel del mar a los 1250 m....

Oeste de Europa y región mediterránea. Toda la Península -excepto el NE y E-, y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oenanthe-crocata.html>

## *Descomyces albus* (Klotzsch) Bougher & Castellano

Macroscopía. Basidiomas hipogeos, tuberiformes, de hasta 6 cm de diámetro, más o menos globosos en la juventud pero lobulados en la vejez o en los eje...

Es la especie hipogea más abundante en los eucaliptales de Asturias, donde crece profusamente bajo el mantillo de hojas, en suelos arenosos....

Originario de Tamasmania y Nueva Zelanda, se ha extendido con el eucalipto por gran parte del mundo. Aparece en las Islas Británicas, Alemania, Franci...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/descomyces-albus.html>

## **Novedades corológicas**

### *Natantiella ligneola* (Berk. & Broome) Réblová (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pola de Somiedo, Somiedo. ASTURIAS el día 25/11/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//14409.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Natantiella ligneola* (Berk. & Broome) Réblová (Ascomycota)

### *Palliolium striatum* (O. F. Müller, 1776) (Mollusca)

### *Sempervivum arachnoideum* L. (Magnoliophyta)

