



Num. 409. Publicado el 28/01/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Hesione splendida*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 409. Publicado el 28/01/2013

Descripciones de especies

Uromyces striatus J. Schröt.

Hongo de tipo roya con un ciclo vital complejo en el que se desarrollan las siguientes fases: Picnidios hipófilos, que aparecen esparcidos entre los ec...

Los picnidios y ecidios aparecen sobre hojas de *Euphorbia cyparissias*, y los uredosoros y los teleutosoros en numerosas especies de *Medicago*, como *Med...*

Aparece en Europa, Argelia, Indias orientales, Japón, América boreal y austral y Nueva Zelanda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/uromyces-striatus.html>

Ornithopus compressus L.

Planta herbácea erecta, decumbente o ascendente. Tallos 4-75 cm, con indumento viloso laxamente dispuesto. Hojas hasta de 12 cm, pecioladas o sentadas,...

Vive en pastizales de anuales, en substrato principalmente silíceo, desde los 10 a los 900(1200) m de altitud....

Región mediterránea, Canarias y Madeira. Dispersa por toda la Península Ibérica -más rara en el E y N- y las Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ornithopus-compressus.html>

Macrosyringion longiflorum (Lam.) Rothm.

Planta herbácea anual, puberulenta y viscosa, con tallos de hasta 65 cm que tienen abundantes pelos tectores, patentes o algo retrorsos, y también pel...

Crece en los pastos secos de los claros de matorral mediterráneo bajo, acompañando a encinares, quejigares o algunos robledales, entre asomos rocosos ...

Aparece en la Península Ibérica y presenta algunas poblaciones aisladas en la zona francesa de los Pirineos y en el Atlas medio de Marruecos. En la Pe...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/macrosyringion-longiflorum.html>

Lycopsis arvensis L.



Planta anual, con uno o varios tallos, muy setoso - hispida, siendo más raro que sea subseríceo. Los tallos, de hasta 70 cm, son erectos, simples o ra...

Se trata de una planta ruderal que vive sobre suelos tanto ácidos como básicos, desde los 400 a los 1200 m de altitud....

Aparece en la mayor parte de Europa salvo en el SE. En la Península es común en la mitad septentrional....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycopsis-arvensis.html>

Hyalopsora adianti-capilli-veneris (DC.) Syd.

Hongo de tipo roya que forma uredosoros hipófilos, esparcidos, confluentes a lo largo de los nervios, redondeados u oblongos, de 0.2 a 0.5 mm, amarill...

Crece sobre frondes de *Adiantum capillus-veneris*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hyalopsora-adianti-capilli-veneris.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Camarops tubulina (Alb. & Schwein.) Shear (Ascomycota)

Coniochaeta ligniaria (Grev.) Masee (Ascomycota)

Coprinopsis ammophilae (Courtec.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert (Basidiomycota)

Stereopsis reidii Losi & A. Gennari (Basidiomycota)

