



Num. 41. Publicado el 19/09/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Polyommatus icarus*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 41. Publicado el 19/09/2005

Descripciones de especies

Ulva linza L.

Talo verde laminar, tubular, más estrecho en la zona basal y formado por 2 capas de células. Puede medir más de 30 cm de largo y hasta 5 cm de ancho, ...

En rocas, piedras, desde el intermareal al submareal....

Presente en casi todos los mares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ulva-linza.html>

Ulva clathrata (Roth) Agardh

Talo verde laminar, tubular, más estrecho en la zona basal y formado por 2 capas de células. Mide hasta unos 40 cm de largo, y está muy ramificado; un...

En rocas, piedras, desde el intermareal al submareal....

Presente en casi todos los mares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ulva-clathrata.html>

Ophiocomina nigra (Abildgaard, 1789)

Oñiura con un disco de unos 25 mm de diámetro, con la superficie dorsal cubierta de finas escamas con gránulos, mientras que en la superficie ventral ...

Se encuentra hasta 200 m de profundidad, aunque es más común entre 10 y 30 m. Vive en zonas arenosas, bajo piedras, a menudo viviendo junto a Ophiotri...

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo y las Azores....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ophiocomina-nigra.html>

Labidoplax inhaerens (Müller, 1776)

Holoturia de cuerpo delgado, de hasta unos 25 cm de longitud. Tiene 12 tentáculos bucales, cada uno con 5 - 7 pares de ramas digitiformes laterales y ...



Vive enterrada en arena o fango, entre 10 y 50 m de profundidad....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/labidoplax-inhaerens.html>

Labidoplax digitata (Montagu, 1815)

Holoturia de cuerpo delgado, de hasta unos 25 cm de longitud. Tiene 12 tentáculos bucales, cada uno con 2 pares de ramas digitiformes laterales y otra...

Vive enterrada en arena o fango hasta 70 m de profundidad....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/labidoplax-digitata.html>

Crisia eburnea (Linnaeus, 1758)

Briozoo que forma colonias densas, a modo de mata de unos 2 cm de altura y formada por ramas más o menos curvas hacia la parte interior. Fijada al sus...

En aguas generalmente no muy profundas, hasta unos 50 m, viviendo sobre algas rojas, conchas, hidrozoos y otros briozoos....

Del Ártico al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crisia-eburnea.html>

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

Cuerpo de gran tamaño, que alcanza los 15 m de longitud. La cabeza tiene un rostro alargado y cónico; la boca es muy grande, de mandíbulas escasamente...

En invierno vive en aguas profundas, hasta 600 m de profundidad, y en verano se acerca a zonas costeras en grupos para alimentarse. Se alimenta filtra...

Cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cetorhinus-maximus.html>

Astropecten irregularis (Pennant, 1777)



Estrella de hasta 12 cm de diámetro, aunque puede llegar a los 20; sus 5 brazos son de forma triangular alargada. La superficie dorsal es aplanada, cu...

A menudo se encuentra enterrada parcialmente en arena o barro, entre 10 y 30 m, aunque se la ha encontrado a 1000 m de profundidad. Se alimenta de mol...

Desde Noruega a las Islas Cabo Verde, también en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/astropecten-irregularis.html>

Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835)

Quisquilla de hasta unos 35 mm de longitud, de rostro ausente o corto, que no alcanza el extremo distal del artículo basal de la antena. Carece de esp...

En aguas poco profundas, fondos rocosos o arenosos, en el internareal o sublitoral. Entre abril y septiembre es posible encontrar hembras con huevos b...

Desde las Islas británicas hasta el Mediterráneo y el Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alpheus-macrocheles.html>

Alpheus glaber (Olivier, 1792)

Quisquilla de hasta unos 43 mm de longitud, de rostro corto que no alcanza el extremo distal del artículo basal de la antena. El caparazón sin prolong...

En fondos de sedimento generalmente desde 30 hasta unos 185 m. Entre marzo y agosto es posible encontrar hembras con huevos bajo el abdomen (hembras o...

Desde las Islas británicas hasta el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alpheus-glaber.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Inachus dorsettensis (Arthropoda)

Leptoplana tremellaris (Müller, 1773) (Platyhelminthes)



Remora remora (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) (Chordata)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008