



## Num. 410. Publicado el 04/02/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Pyrenaearia cantabrica*. Por César Fernández González



**Num. 410. Publicado el 04/02/2013**

## Descripciones de especies

### *Pyrenaearia cantabrica* (Hidalgo, 1873)

Molusco terrestre con una concha de 4-6 x 10.5-14 mm, muy delgada, de color marfileño, transparente pero no brillante, finamente estriada; los juvenil...

Vive en zonas rocosas, bajo salientes de rocas en zonas secas donde suelen tener pelos para retener la humedad de la niebla, o en zonas verticales cua...

Endémico del norte de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrenaearia-cantabrica.html>

### *Lycoperdon molle* Pers.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de esféricos o piriformes a turbinados, de 20-40 mm de diámetro a 25-50 mm de altura, con la base, estéril, a modo de...

Vive en bosques de planifolios, siendo más raro encontrarlo en formaciones de coníferas, durante primavera y otoño....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-molle.html>

### *Inachus leptochirus* Leach, 1817

Cangrejo con una caparazón de 21 a 30 mm, estrechado en la parte anterior, con la superficie cubierta de pequeñas sedas con forma de gancho a las que ...

Vive en el rango entre la marea baja y los casi 150 m de profundidad en sustratos con piedras y conchas, menos frecuentemente en fondos arenosos....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inachus-leptochirus.html>

### *Dianthus barbatus* L.

Planta perenne, con renuevos. Cepa gruesa, oblicua. Tallos floríferos(20)30-50(75) cm, erectos, gruesos, inferiormente no angulosos y no ramosos,g...

Aparece en matorrales de rododendro y pastos del piso subalpino, principalmente; en suelos ácidos, desde los 1600 a los 2400 m de altitud en la



zona d...

Europa meridional, Caucasia y Armenia; ampliamente introducida en otras regiones. Pirineos centrales. Cultivada y asilvestrada en otros lugares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-barbatus.html>

## *Ballota nigra* L.

Hierba 15-82 cm, perenne. Tallos acanalados en las caras y con cantos engrosados, más o menos pelosos, frecuentemente más pelosos en los cantos, con ...

Vive en los lugares nitrificados húmedos, junto a cursos de agua o en prados umbríos, indiferente edáfica desde los 5 a los 1500 m de altitud....

Región mediterránea, Europa y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ballota-nigra.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Chondrina kobelti* (Westerlund, 1878) (Mollusca)

*Cystopteris diaphana* (Bory) Blasdell (Pteridophyta)

*Cystopteris viridula* (Desv.) Desv. (Pteridophyta)

*Inachus leptochirus* Leach, 1817 (Arthropoda)

*Inachus thoracicus* Roux, 1830 (Arthropoda)

*Lamprospora tuberculatella* Seaver (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

