



Num. 413. Publicado el 25/02/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Calopteryx virgo*. Por Luis Ángel Díaz Álvarez



Num. 413. Publicado el 25/02/2013

Descripciones de especies

Leucothea multicornis (Quoy & Gaimard, 1824)

Ctenóforo con el cuerpo translúcido, lateralmente comprimido, de hasta 200 mm de longitud. Presenta unos lóbulos orales entre la boca y el estatociste...

Pelágico, se acerca a las costas arrastrado por la corriente....

Vive en aguas tropicales y subtropicales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucothea-multicornis.html>

Laevicardium crassum (Gmelin, 1791)

Molusco bivalvo con una concha de hasta 75 mm, sólida y gruesa, ligeramente convexa y ovalada. Escultura formada por unas 50 costillas apenas marcadas...

Vive principalmente en alta mar, en sustratos de arena y grava conchífera....

Desde Noruega al Mediterráneo y el oeste de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/laevicardium-crassum.html>

Inachus thoracicus Roux, 1830

Cangrejo con un caparazón abombado, de 31x30 mm de tamaño, y cubierto por una densa pilosidad que recubre todo el caparazón, dándole un tacto aterciop...

Es común entre los 70 y 100 m de profundidad....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inachus-thoracicus.html>

Calopteryx virgo Linnaeus, 1758

Caballito del diablo de hasta 45 mm de tamaño, de color azul metálico, con los tres últimos segmentos abdominales de color rosa claro en la parte vent...

Vive principalmente en arroyos de pequeño y medio tamaño en zonas con arbolado cercano y aguas no eutrofizadas, de poca profundidad y con corriente du...



Aparece en el Europa, excepto en el extremo norte, en África del Norte, Oriente Próximo y la parte norte de Asia, alcanzando Japón....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calopteryx-virgo.html>

Anemone trifolia subsp. albida (Mariz) Ulbr.

Planta perenne, con un rizoma delgado, horizontal, cubierto por escamas membranosas de bordeondulado y blanco. Tallo 10-20 cm, débil. Hojas, muy pers...

Crece en los prados y el borde forestal húmedo en zona de robledales, desde el nivel del mar a los 1000 m de altitud....

Endemismo de Galicia y la mitad norte de Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anemone-trifolia-subsp-albida.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf (Ascomycota)

Campaea margaritata Linnaeus, 1767 (Arthropoda)

Miltochrista miniata Forster, 1771 (Arthropoda)

Pulvinula laeterubra (Rehm) Pfister (Ascomycota)

