



Num. 419. Publicado el 08/04/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Romulea clusiana*. Por José Luis Porto Torres



Num. 419. Publicado el 08/04/2013

Descripciones de especies

Upupa epops Linnaeus, 1758

La abubilla es un ave muy fácil de reconocer. Presenta tonos ocres en la mitad anterior del cuerpo y unas bandas negras transversales en la mitad post...

Aparece en zonas boscosas abiertas a menos de 1000 m de altitud, como encinas, alcornoques, melojos, fresnos,... Se alimenta de larvas y pupas de inse...

La subespecie tipo aparece en la mayor parte del Paleártico, desde Canarias a China. En España aparece en toda la Península si bien escasea en la fran...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/upupa-epops.html>

Smardaea amethystina (W. Phillips) Svrček

Macroscopía. Ascomas cupuliformes y sésiles o subsésiles de hasta 25 x 15 mm, con el himenio liso de color violeta profundo. Margen irregular y glabro...

Crece en suelo calcáreo recubierto por briófitos bajo *Quercus ilex* y *Olea europaea*. ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/smardaea-amethystina.html>

Romulea clusiana (Lange) Nyman

Planta perenne provista de un bulbo sólido, de hasta 13 mm de diámetro, del cual surge un tallo que al florecer mide los 16 cm. Las hojas son dos basal...

Esta planta crece en herbazales y pastizales, generalmente en playas y dunas del litoral, siendo más raro encontrarla en zonas interiores....

Zonas costeras del norte y sur de la Península Ibérica y NO de África (Marruecos). Aparece en algunos puntos en el interior de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/romulea-clusiana.html>

Bryum capillare Hedw.

Musgo que forma céspedes densos, de color de verde a pardusco. La planta tiene hasta unos 5 cm de altura. Los filidos aparecen dispuestos en



espiral a...

Este musgo crece en los suelos de los bordes de bosques, en zonas humíferas, grietas con tierra y también epífita, sobre diversas especies de árboles....

Ampliamente distribuido por toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bryum-capillare.html>

Alvania carinata (da Costa, 1778)

Concha de unos 5 mm de altura y 3 de anchura, de color blanquecino, ligeramente amarillenta, de forma ovalada o cónica, con 5 o 6 vueltas de espira, o...

Vive en el intermareal y aguas poco profundas, entre algas y bajo piedras....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alvania-carinata.html>

Novedades corológicas

Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Bustariega, Somiedo. ASTURIAS el día 01/04/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melanconis-stilbostoma-fr-tul-c-tul-1/14994.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus michaudii Boud. (Ascomycota)

Eunice harassi Audouin & Edwards, 1834 (Annelida)

Eunice pennata (O.F. Müller, 1776) (Annelida)

Pleomassaria siparia (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Rabenhorstia tiliae (Fr.) Fr. (Ascomycota)

Romulea clusiana (Lange) Nyman (Magnoliophyta)

Smaradsea amethystina (W. Phillips) Svrček (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



Soldanella alpina L. (Magnoliophyta)

Upupa epops Linnaeus, 1758 (Chordata)

