



## Num. 42. Publicado el 26/09/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Gibbula umbilicalis*. Por César Fernández González



**Num. 42. Publicado el 26/09/2005**

## Descripciones de especies

### *Procerodes littoralis* (Ström 1768)

Platelminto de cuerpo ovalado, de unos 6 mm de longitud y 1 de ancho, con la parte anterior más estrecha. Tiene dos tentáculos o lóbulos cefálicos tri...

Presente en el intermareal, bajo piedras generalmente, en zonas de grava o arena donde hay aportes de agua dulce....

Atlántico norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/procerodes-littoralis.html>

### *Pleurobrachia pileus* (Muller, 1776)

Cuerpo ovalado ligeramente redondeado, de 2 - 3 cm de longitud. Las filas de peines vibrátiles van desde el ápice hasta casi la altura de la boca. Ten...

En aguas abiertas, a veces en charcas del intermareal....

Desde el norte de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pleurobrachia-pileus.html>

### *Petromyzon marinus* Linnaeus, 1758

Cuerpo serpentiforme de piel lisa y sin escamas que alcanza casi 1 m de longitud. Carece de aletas pares. La boca no tiene mandíbulas, es redondeada y...

Es un animal parásito, que se adhiere con su boca a peces y mamíferos, chupándoles la sangre de la herida que les produce con sus dientes; su saliva t...

Desde Noruega al N de África y el Mediterráneo. Costa NE de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/petromyzon-marinus.html>

### *Pagellus bogaraveo* (Brünnich, 1768)

Pez de 35 cm de longitud, a veces mayor, de cuerpo ovoide, más convexo en la parte dorsal, y comprimido lateralmente. Cabeza con la boca ínfera, con d...



Hasta 400 m de profundidad, gregario, que vive entre rocas y algas. Se alimenta de crustáceos, moluscos y larvas de peces. Es hermafrodita proterándri...

Desde Noruega a Mauritania y Mediterráneo oeste....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pagellus-bogaraveo.html>

## *Merluccius merluccius* (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo alargado, de unos 120 cm de longitud, aunque generalmente no supera los 70 cm, cubierto de pequeñas escamas. Cabeza aguda y alargada, co...

Vive entre 30 y 500 m de profundidad, estando en invierno a más profundidades que en verano, cuando se acerca a la costa. Se alimenta de peces (anchoa...

Desde Noruega a Mauritania y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/merluccius-merluccius.html>

## *Hormiphora cucumis* (Mertens, 1833)

Cuerpo en forma de mitra, de unos 15 cm de longitud, sin tentáculos; el extremo oral algo aplanado y ancho. Las filas de peines vibrátiles son de igua...

Vive en aguas libres....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hormiphora-cucumis.html>

## *Convoluta convoluta* (Abildgaard 1806)

Gusano de hasta 3 mm de longitud, de cuerpo plano, en forma de hoja, con los márgenes laterales curvados hacia arriba frecuentemente. La cabeza es anc...

Vive entre algas, hasta unos 15 de profundidad....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/convoluta-convoluta.html>

## *Cestum veneris* Lesueur, 1813

Cuerpo con forma de cinta, de 8 cm de longitud y 1.5 de altura. Las 4 filas de peines vibrátiles, transparentes, cubren todo el animal. Dos



tentáculo...

Vive en aguas abiertas....

Desde el sur de las Islas Británicas al mar Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cestum-veneris.html>

## *Callionymus lyra* Linnaeus, 1758

Pez de hasta 30 cm de longitud, de cuerpo alargado, delgado y comprimido dorsoventralmente, sin escamas. La cabeza tiene forma triangular, con la boca...

Vive hasta unos 5 a 400 m de profundidad o más, sobre sustratos blandos. Es territorial y muy agresivo. Se alimenta de poliquetos, crustáceos y molusc...

Desde Islandia y Noruega a Mauritania, incluido el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/callionymus-lyra.html>

## *Blennius ocellaris* Linnaeus, 1758

Pez de unos 17 cm de longitud, de cuerpo alto. La cabeza es grande y tiene 2 tentáculos supraorbitales encima de cada ojo, siendo más largos que el di...

Puede llegar a unos 100 m de profundidad, encontrándose en aguas someras generalmente, entre algas calcáreas o sustratos duros. Tiene hábitos nocturno...

Desde el sur de las Islas Británicas a Marruecos; también en el Mediterráneo y Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/blennius-ocellaris.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Labrus bimaculatus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Nucula nitidosa* (Mollusca)



*Sarcocornia perennis* (Miller) A. J. Scott (Magnoliophyta)

*Terebratulina retusa* (Brachiopoda)

