



Num. 429. Publicado el 17/06/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Ranunculus seguieri subsp. cantabricus*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 429. Publicado el 17/06/2013

Descripciones de especies

Phytolacca americana L.

Hierba de 1-3 m, erecta, a veces leñosa en la base, glabra o glabrescente, de olor desagradable. Tallo cuadrangular, estriado, verde o rojizo, grueso...

Crece en márgenes de caminos, junto a muros y ruinas, en lugares frescos y umbrosos, particularmente junto a las poblaciones....

Originaria del N de América, naturalizada en casi todo el mundo. En la Península, provincias litorales y centrales de clima no extremado....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phytolacca-americana.html>

Lupinus luteus L.

Planta de hasta 100 cm, herbácea, anual, más o menos peloso-seríceo. Tallo vigoroso, con ramas basales prostrado-ascendentes o bien las superiores ere...

Vive en matorrales degradados, cultivos abandonados, bordes de caminos, cunetas, etc., en suelos neutros, descarbonatados, o ácidos (pH 5-7, textura...

Nativa de la Región Mediterránea occidental; ampliamente cultivada por toda Europa, Sud-áfrica, Australia y Estados Unidos. Mitad W de la Península ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lupinus-luteus.html>

Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)

Araña de 3.5 a 4.7 mm de longitud. Prosoma amarillo anaranjado, con un margen delgado oscuro una banda media ancha parda; el sternum es amarillento ro...

Suele encontrarse entre arbustos en zonas cálidas....

Especie mediterránea, que aparece desde las Islas Canarias y Cabo Verde y alcanza Europa central y Azerbaiyán por el este....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/kochiura-aulica.html>

Kickxia spuria subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fern.

Hierba anual, hasta de 60 cm, densamente glandular-pubescente, con pelostectores largos y abundantes, y pelos glandulíferos cortos y escasos. Tallos...



Vive en cultivos, bordes de caminos y, en general, en terrenos abiertos removidos, en suelos pedregosos algo arcillosos, preferentemente calcáreos,...

Región mediterránea, S y W de Europa, Azores, Canarias, y SW de Asia. Gran parte de la Península y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/kickxia-spuria-subsp-integrifolia.html>

Carex divulsa Stokes

Planta herbácea perenne con un rizoma grueso, que forma céspedes de hasta 60 cm de diámetro, con tallos de 25 a 60 cm, trígonos, de ángulos agudos, es...

Crece en prados, formaciones riparias, desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud...

Aparece en gran parte de Europa, N de África y zonas del O de Asia; ha sido introducida en el E de Norteamérica. En la Península Ibérica crece en casi...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-divulsa.html>

Novedades corológicas

Ascobolus behntziensis Kirscht. (Ascomycota)

Nuevo para el catálogo micológico asturiano - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pola de Somiedo, Somiedo. ASTURIAS el día 12/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ascobolus-behntziensis-kirscht-1/15596.html>

Asteromassaria macrospora (Desm.) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 10/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//15575.html>

Ciboria americana E.J. Durand (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Aguasmestas, Somiedo. ASTURIAS el día 12/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ciboria-americana-e-j-durand-1/15605.html>

Gloeotinia aschersoniana (Henn. & Plötn.) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 16/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//15656.html>

Gnomonia betulina Vleugel (Ascomycota)



Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 11/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/gnomonia-betulina-vleugel-1/15587.html>

Hypoxylon julianii L.E. Petrini (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ponteixina, Somiedo. ASTURIAS el día 13/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hypoxylon-julianii-l-e-petrini-1/15618.html>

Lophiostoma quadrinucleatum P. Karst. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 11/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-quadrinucleatum-p-karst-1/15578.html>

Myriosclerotinia sulcatula T. Schumach. & L.M. Kohn (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 14/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/myriosclerotinia-sulcatula-t-schumach-l-m-kohn-1/15629.html>

Sporormia fimetaria (Rabenh.) De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Braña de Momián, Somiedo. ASTURIAS el día 12/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/sporormia-fimetaria-de-not-1/15599.html>

Thelebolus crustaceus (Fuckel) Kimbr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 14/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/thelebolus-crustaceus-fuckel-kimbr-1/15635.html>

Trichopeziza subsulphurea (Svrček) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 10/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/trichopeziza-subsulphurea-svrcek-baral-1/15567.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus behntziensis Kirscht. (Ascomycota)

Ciboria americana E.J. Durand (Ascomycota)

Doto koenneckeri (Lemche, 1976) (Mollusca)



Gnomonia betulina Vleugel (Ascomycota)

Hypoxyton julianii L.E. Petrini (Ascomycota)

Lophiostoma quadrinucleatum P. Karst. (Ascomycota)

Myriosclerotinia sulcatula T. Schumach. & L.M. Kohn (Ascomycota)

Ophrys tenthredinifera Willd. (Magnoliophyta)

Ranunculus seguieri subsp. cantabricus Rivas Mart., Izco & Costa (Magnoliophyta)

Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév. (Ascomycota)

Sporormia fimetaria (Rabenh.) De Not. (Ascomycota)

Thelebolus crustaceus (Fuckel) Kimbr. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008