



Num. 430. Publicado el 24/06/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Catananche caerulea*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 430. Publicado el 24/06/2013

Descripciones de especies

Ophrys tenthredinifera Willd.

Orquídea con 2 tubérculos subglobosos o subovoides, sésiles. Tallos (8)10-60 cm, erectos, ligeramente flexuosos. Hojas 3,5-12 x 1-4 cm, las basales ova...

Vive en pastizales, claros de matorrales y bosques, tanto en substratos básicos como ácidos, aunque muestra preferencia por los primeros y en particul...

Región mediterránea y Canarias. Dispersa por casi toda la Península y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-tenthredinifera.html>

Epipactis phyllanthes G.E. Sm.

Orquídea con un rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, robustas, numerosas. Tallos 20-40cm, de ordinario solitarios o en grupos de 2-4, erguidos, r...

Vive en dunas fijas y cultivos de pinos sobre ellas, desde el nivel del mar a los 50 m....

Aparece en las costas atlánticas de Europa -desdelas Islas Británicas y Dinamarca hasta el N de la Península-. N de la Península, donde aparecen muy...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-phyllanthes.html>

Echium plantagineum L.

Hierba 20-80 cm, anual, rara vez bienal, uni- o multicaule, hispida o serícea. Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados en la parte superi...

Es una planta arvense, ruderal, viaria, en substrato básico o ácido, que crece desde el nivel del mar a los 1200 m....

Aparece en el O, E y S de Europa, SW de Asia, N de África, Macaronesia -excepto en Cabo Verde-; naturalizada en C, N y E de Europa y Australia. Comú...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echium-plantagineum.html>

Doto koenneckeri (Lemche, 1976)

Pequeño nudibranchio de hasta unos 5 mm de longitud, de color amarillento, si bien presenta en los tubérculos de los ceratas unas manchas



alargadas de...

Suele encontrarse desde el límite de las bajamares vivas hasta 30 m de profundidad y siempre sobre su presa, el hidrozoo *Lytocarpia myriophyllum*, si b...

Su área de distribución abarca desde Noruega y las islas Británicas hasta las islas Azores, la región de Estrecho de Gibraltar y las costas de Tarrago...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/doto-koenckeri.html>

Arum italicum Mill.

Planta herbácea con un tubérculo 2-5 x 2,4-8 cm, rizomatoso, del que se desarrollan raíces hasta de 15 cm. Profilos 2-17,5 x 0,9-2,5 cm, papiráceos, ...

Indiferente edáfica, suelos húmedos, nitrificados y removidos, sobre todo por el ganado; proximidades de núcleos rurales, huertos, umbrías de roquedo...

Europa hasta Turquía e Iraq, N de África; naturalizada en Argentina y Nueva Zelanda. Dispersa acá y allá por todo el territorio....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arum-italicum.html>

Novedades corológicas

Broomella vitalbae (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ronderos, Quirós. ASTURIAS el día 20/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/broomella-vitalbae-berk-broome-sacc-1/15708.html>

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

- Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ronderos, Quirós. ASTURIAS el día 21/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-caulium-fr-ces-de-not-s-lat-1/15722.html>

Orbilina flavida Feltgen (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ronderos, Quirós. ASTURIAS el día 20/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/orbilina-flavida-feltgen-1/15700.html>

Rebentischia unicaudata (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ronderos, Quirós. ASTURIAS el día 21/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/rebentischia-unicaudata-berk-broome-sacc-1/15719.html>



Triblidium caliciforme Rebent. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Fructuoso, Tineo. ASTURIAS el día 20/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/triblidium-caliciforme-rebent-1/15705.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aegilops ventricosa Tausch (Magnoliophyta)

Broomella vitalbae (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Catananche caerulea L. (Magnoliophyta)

Gnathia maxillaris (Montagu, 1804) (Arthropoda)

Lewia scrophulariae (Desm.) M.E. Barr & E.G. Simmons (Ascomycota)

Orbilina flavida Feltgen (Ascomycota)

Rebentischia unicaudata (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Scorzonera laciniata L. (Magnoliophyta)

Triblidium caliciforme Rebent. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008