



## Num. 432. Publicado el 08/07/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Epipactis palustris*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 432. Publicado el 08/07/2013**

## Descripciones de especies

### *Onobrychis reuteri* Leresche

Sufrútice hasta de 40 cm, esparcidamente seríceo. Tallos hasta de 20 cm, decumbentes o ascendentes. Hojas (2,5)3-6,5 cm, subsentadas, las basilares gen...

Vive en pastizales, en substrato calizo, desde los 1000 a los 1200 m de altitud....

Es una planta endémica de la Cordillera Cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/onobrychis-reuteri.html>

### *Hypericum undulatum* Schousb. ex Willd.

Hierba perenne, glabra, de hasta 120 cm, con tallos con ramas estériles, glándulas negras y 4 alas longitudinales, estrechas, unduladas, erosas. Hojas ...

Crece en juncales, riberas, trampales y otros humedales; preferentemente en substratos ácidos, desde el nivel del mar a los 1500(3000) m....

Madeira, Azores, O de Europa, NO de África e ¿Italia? Difundida por el O de la Península Ibérica, falta en Levante, Murcia y Baleares...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-undulatum.html>

### *Gnathia maxillaris* (Montagu, 1804)

Isópodo de hasta 5 mm de longitud los adultos. Las pranizas tardías presentan un pereión con los segmentos III-V fusionados y dilatados. El flagelo de...

Los adultos viven en zonas litorales, posiblemente sea la especie de la familia que más fácilmente aparece en el intermareal. Los adultos se esconden ...

Aparece desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gnathia-maxillaris.html>

### *Cytisus multiflorus* (LHér.) Sweet

Arbusto 0,8-1,5 m, erecto, con hojas bien desarrolladas solo después de la floración, de aspecto retamoide. Ramas angulosas, con (6)8 costillas en fo...



Claros de robledales o encinares, campos abandonados, roquedos, taludes o bordes de caminos, frecuentemente sobre granitos o cuarcitas, rara vez en p...

Endémico de la mitad occidental de la Península Ibérica, algo más escasa hacia el E. Ha sido introducida en Francia, Italia, Inglaterra, N de América...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cytisus-multiflorus.html>

## *Bacopa monnieri* (L.) Wettst.

Hierba perenne, subacuática, glabra en la parte vegetativa. Tallos 5-30(60) cm, glabros; los vegetativos, rastreros y enraizantes en los nudos, forma...

Vive en bordes de arroyo y otros humedales cerca del mar, desde el nivel del mar a los 50 m de altitud...

Ampliamente distribuida en regiones tropicales y subtropicales. Localmente naturalizada en Galicia y N de Portugal...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bacopa-monnieri.html>

## Novidades corológicas

### *Leptosphaeria agnita* (Desm.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valle de Lago, Somiedo. ASTURIAS el día 06/07/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/leptosphaeria-agnita-desm-ces-de-not-1/15885.html>

### *Taphrina padi* (Jacz.) Mix (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valle de Lago, Somiedo. ASTURIAS el día 06/07/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/taphrina-padi-jacz-mix-1/15894.html>

### *Unguiculariopsis ravenelii* (Berk. & M.A. Curtis) W.Y. Zhuang & Korf (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Oviedo, Oviedo. ASTURIAS el día 03/07/2013

Más información en

<http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/unguiculariopsis-ravenelii-subsp-hamata-chenant-w-y-zhuang-1/15844.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

### *Buglossoides incrassata* (Guss.) I.M. Johnst. (Magnoliophyta)



*Leptosphaeria agnita* (Desm.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

*Oecobius navus* Blackwall, 1859 (Arthropoda)

*Sepedon sphegea* Fabricius, 1775 (Arthropoda)

*Taphrina padi* (Jacz.) Mix (Ascomycota)

*Typhaeus typhoeus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Unguiculariopsis ravenelii* (Berk. & M.A. Curtis) W.Y. Zhuang & Korf (Ascomycota)

