



## Num. 435. Publicado el 29/07/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Calotriton asper*. Por José Rafael González López



**Num. 435. Publicado el 29/07/2013**

## Descripciones de especies

### *Leiobunum blackwalli* (Meade, 1861)

Las especies de *Leiobunum* tienen un tamaño de cuerpo mediano (machos 2.5-3.5- mm y hembras 4-6 mm) y patas extraordinariamente largas (hasta 72 mm) y ...

*Leiobunum blackwalli* es una especie bastante común y abundante, adaptada a numerosos hábitats. Puede habitar en zonas húmedas boscosas y zonas más xer...

*Leiobunum blackwalli* es una especie del oeste y centro de Europa extendida desde Polonia (Martens, 1978) hasta la Península Ibérica, donde se extiende...

Por Izaskun Merino-Sáinz y Fernando Ángel Fernández-Álvarez

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leiobunum-blackwalli.html>

### *Juncus alpino-articulatus* Chaix

Hierba perenne, de 4-30(48) cm, rizomatosa, con brotes generalmente extravaginales; rizoma estolonífero, horizontal, con entrenudos de 1-12 x 1,5-3,8 ...

Crece en pastos higroturbosos y comunidades de cárices en turberas ácidas, desde los 1460 a los 2950 m....

Europa, SW de Asia y NW de África. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico septentrional, Sistema Central, macizo de Gúdar, Sierra Nevada y s...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juncus-alpino-articulatus.html>

### *Cistus ladanifer* L.

La jara pringosa es un arbusto de 50-200(400) cm, ramoso, erecto, a veces procumbente, con leño duro y corteza pegajosa, pardo-rojiza, que no se despr...

Vive en jarales, en regiones de clima con verano seco y caluroso; en la mitad meridional peninsular sobre suelos silíceos, y en gran parte de la occid...

Península Ibérica y Francia meridional. Abunda en la mitad W de la Península Ibérica, escasea o es adventicia en el N y E peninsulares, falta en el N...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cistus-ladanifer.html>



## *Calotriton asper* (Dugès, 1852)

El tritón pirenaico es un anfibio de entre 90 y los 160 mm. La coloración dorso-lateral en general es marrón pardusca, presentando una gran variabilidad...

Especie típicamente acuática que habita preferentemente los torrentes de montaña media-alta con fuerte desnivel de aguas frías y fuerte ...

El tritón pirenaico es un endemismo de los Pirineos que se distribuye por España, Francia y Andorra, con una distribución típicamente montana y altimo...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calotriton-asper.html>

## *Calma glaucoides* Alder & Hancock, 1854

Nudibranquio de hasta 23 mm que puede aparecer en dos formas, una con ceratas largas y otra con ellos cortos. Aparecen dispuestos en hasta 12 grupos c...

Calma glaucoides se alimenta de las puestas de cefalópodos y peces, especialmente góbidos, blénidos y chafarrocas. Estos huevos se disponen normalment...

Aparece desde las costas de Noruega hasta el mar Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calma-glaucoides.html>

## **Novedades corológicas**

### *Lophiostoma appendiculatum* Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Granda, Avilés. ASTURIAS el día 22/07/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-appendiculatum-fuckel-var-appendiculatum-1/16062.html>

### *Massariosphaeria typhicola* (P. Karst.) Leuchtm. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Granda, Avilés. ASTURIAS el día 25/07/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/massariosphaeria-typhicola-p-karst-leuchtm-1/16105.html>

### *Xysticus nubilus* Simon, 1875 (Arthropoda)

Primera cita para Asturias - Citado por Rafa González en Zeluán (Gozón), Gozón. ASTURIAS el día 28/07/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/xysticus-nubilus/16147.html>



## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Andrena nitida* (Müller, 1776) (Arthropoda)

*Calma glaucoides* Alder & Hancock, 1854 (Mollusca)

*Depressaria daucella* (Denis & Schiffermuller, 1775) (Arthropoda)

*Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel (Magnoliophyta)

*Galerina atkinsoniana* A. H. Sm. (Basidiomycota)

*Leiobunum blackwalli* (Meade, 1861) (Arthropoda)

*Loboptera decipiens* (Germar, 1817) (Arthropoda)

*Marmota marmota* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Massariosphaeria typhicola* (P. Karst.) Leuchtm. (Ascomycota)

*Phellinus punctatus* (Fr.) Pilát (Basidiomycota)

*Phlebia subochracea* (Bres.) J. Erikss. & Ryvarde (Basidiomycota)

*Teucrium polium* L. (Magnoliophyta)

*Teucrium polium subsp. polium* L. (Magnoliophyta)

*Urocystis floccosa* (Wallr.) D.M. Hend. (Basidiomycota)

*Xysticus erraticus* (Blackwall, 1834) (Arthropoda)

*Xysticus nubilus* Simon, 1875 (Arthropoda)

