



## Num. 436. Publicado el 05/08/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Ciborinia camelliae*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 436. Publicado el 05/08/2013**

## Descripciones de especies

### *Polycyathus muelleriae* (Abel, 1959)

Madreporario colonial, es coralitos de sección circular de unos 6 mm de diámetro. Las colonias son incrustantes y de morfología variada. Los pólipos c...

Crece en el infralitoral a partir de los 5 m de profundidad hasta los 30 - 40 m de profundidad, en zonas umbrosas o en el interior de las cuevas. Polyc...

*Polycyathus muelleriae* se encuentra muy repartido por todo el Mediterráneo, desde las costas españolas del estrecho de Gibraltar, hasta el Líbano y Bei...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polycyathus-muelleriae.html>

### *Parablennius rouxi* (Cocco, 1833)

Blénido de hasta 8 cm de longitud, de color blanco con una lateral pardo oscura que va desde el ojo hasta la aleta caudal. Los machos en celo presenta...

Vive desde el intermareal hasta los 42 m de profundidad, en zonas rocas iluminadas o de guijarros sin cobertura de algas. Los machos viven en agujeros...

Desde el Mediterráneo hasta la costa de Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/parablennius-rouxi.html>

### *Ophrys speculum* Link

Tubérculos 2(3), subglobosos, sésiles o subsésiles. Tallos 7-50(65) cm, erectos, ligeramente flexuosos. Hojas basales 3-10 x 1,5-4,5 cm, ovado-lanceol...

Crece en pastizales, cultivos, claros de matorrales, tanto en substratos básicos como ácidos, desde el nivel del mar a los 1100 m....

Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península -salvo en el NW- e Islas Baleares...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-speculum.html>

### *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal, 1833



El adulto del gorgojo del eucalipto mide entre 7 y 9 mm y su color va desde el rojo tostado claro de jóvenes a un pardo oscuro al envejecer.El hue...

*Gonipterus scutellatus* se alimenta de las hojas del eucalipto, tanto en fase larvaria como en imago: en el primer y segundo estadio las larvas dañan l...

*Gonipterus scutellatus* es un gorgojo originario de Australia pero que aparece allá donde se ha introducido el eucalipto. Es posible observarlo en Chin...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gonipterus-scutellatus.html>

## *Ciborinia camelliae* L.M. Kohn

Este hongo provoca el marchitamiento precoz de las flores de las camelias (*Camellia* japónica). El hongo en su fase sexual forma apotecios cupuliformes...

Crece parasitando camelias. Puede aparecer afectando a todos los cultivares e híbridos de *Camellia japonica*, *Camellias sasanqua* y *Camellia reticulata*...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, E. y MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ciborinia-camelliae.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Capperia britanniodyctylus* (Gregson, 1869) (Arthropoda)

*Ciborinia camelliae* L.M. Kohn (Ascomycota)

*Ctenarytaina eucalypti* (Maskell 1890) (Arthropoda)

*Larinus sturnus* (Schaller, 1783) (Arthropoda)

*Larinus turbinatus* Gyllenhal, 1835 (Arthropoda)

*Quercus coccifera* L. (Magnoliophyta)

*Rutpela maculata* (Poda, 1761) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

