



Num. 438. Publicado el 19/08/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Linaria nivea*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 438. Publicado el 19/08/2013

Descripciones de especies

Ranunculus muricatus L.

Planta herbácea anual, de (2)5-50(65) cm, glabra o setosa, con pelos patentes o subreflejos, a veces adpresos en el pedúnculo floral. Tallos recios, ...

Vive en terrenos húmedos: cultivos, pastos, cunetas y depresiones inundables, medios alterados en general....

Aparece en el S de Europa, O de Asia, N de África, Macaronesia; naturalizada en América yAustralia. Frecuente en todas las provincias de clima cálido...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-muricatus.html>

Lipobranchius jeffreysii (McIntosh, 1869)

Anélido poliqueto de cuerpo rosado o amarillento claro, corto, vermiforme, de 26 mm, formado por 31 segmentos que constan de tres anillos cada uno. Ep...

Crece en la zona sublitoral en tubos que construye en zonas fangosas....

Desde el Mar del Norte a la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lipobranchius-jeffreysii.html>

Juncus balticus subsp. *pyrenaicus* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) P. Fourn.

Hierba perenne, de 17-50 cm, rizomatosa; rizoma estolonífero, con entrenudos de 1-6 x c. 3 mm de diámetro, más o menos cubierto por vainas escuamiformes...

Crece en pastos en suelos higroturbosos o arenosos, desde los 1500 a los 2400 m de altitud. ...

S de Francia y N de la Península Ibérica. Pirineos, Cordillera Cantábrica y macizo de Gúdar. E...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juncus-balticus-subsp-pyrenaicus.html>

Hornungia petraea subsp. *petraea* (L.) Rchb.

Planta herbácea de 2-15 mm, con 1-30 tallos, ramificados ya desde la base o en el tercio inferior, de laxa a densamente pelosos. Hojas basales de 4-32 ...



Es frecuentemente sobre roquedos o en pastos terofíticos, a veces nitrificados, tanto en sustratos ácidos como básicos, desde los 100 a los 2200 m....

Aparece en Eurasia y el N de África. Toda la Península y Baleares, excepto en algunas zonas del O de influencia atlántica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hornungia-petraea-subsp-petraea.html>

Alchemilla iniquiformis S.E. Fröhner

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 5-30 x 0,1-0,2 cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la ros...

Vive en prados y pastos, preferentemente a la orilla de pequeños arroyos; higrófila; en sustrato calizo osilíceo, desde los 1150 a los 2500 m....

Crece en los Pirineos franceses y españoles -valles del Roncal, Ansó, Hecho, delGállego, de Arán y de Espot- y Cordillera Cantábrica -desde el puert...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alchemilla-iniquiformis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calycellina spiraeae (Roberge ex Desm.) Dennis (Ascomycota)

Camptopus lateralis (Germar, 1817) (Arthropoda)

Cerura vinula Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Chamaesyce canescens (L.) Prokh. (Magnoliophyta)

Chamaesyce canescens subsp. canescens (L.) Prokh. (Magnoliophyta)

Lichenomphalia velutina (Quél.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (Basidiomycota)

Linaria nivea Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

Melastiza boudieri (Höhn.) Le Gal (Ascomycota)

Oligocladus sanguinolentus (Quatrefages, 1845) (Platyhelminthes)

Phaeosphaeria eustoma (Fuckel) L. Holm (Ascomycota)



Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Pistorinia hispanica (L.) DC. (Magnoliophyta)

Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) (Arthropoda)

