



Num. 44. Publicado el 10/10/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Balsamia polysperma*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 44. Publicado el 10/10/2005

Descripciones de especies

Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)

Góbido de unos 14 cm de longitud, de cuerpo alargado, con escamas excepto en la parte superior de la cabeza hasta la primera aleta dorsal. La cabeza o...

Sublitoral, vive sobre fondos rocosos poco iluminados, por lo que suele encontrarse en cuevas o agujeros. Se alimenta de crustáceos, poliquetos, molus...

Desde el sur de Noruega a Canarias y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thorogobius-ephippiatus.html>

Symphodus melops (Linnaeus, 1758)

Lábrido de cuerpo ovalado, alargado, que llega a los 30 cm de longitud, aunque no suele sobrepasar los 15 cm. La cabeza es de menor o igual tamaño que...

Especie costera, que se encuentra hasta unos 30 m de profundidad entre rocas y algas. Se alimenta de crustáceos y moluscos. A veces presenta comportam...

De Noruega a Marruecos y las Azores. Mediterráneo oeste....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/symphodus-melops.html>

Spongia agaricina (Pallas, 1766)

Esponja de forma irregular, de unos 4 - 30 cm de altura, aunque generalmente tiene una base pedunculada de la que sale una lámina en forma de cáliz o...

Desde 20 a 50 m de profundidad, sobre fondos ricos en detritos. No es muy abundante....

Mediterráneo y costa atlántica adyacente....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spongia-agaricina.html>

Petalonia fascia (Müller) Kuntze

Alga parda con una estructura de fijación pequeña y discoidal, a veces incrustante, de la que surgen láminas de hasta 30 cm de longitud, aunque



genera...

Sobre rocas, algas, en zonas arenosas, a veces de salinidad variable, en el intermareal....

Desde Noruega a Senegal y el Mediterráneo. NO y NE de América, Caribe, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y la Antártida....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/petalonia-fascia.html>

Obelia geniculata (Linnaeus, 1758)

Hidroideo colonial, formado por un estolón recto del que salen ejes espaciadamente ramificados, de unos 4 - 5 cm de altura y con forma de zigzag; el c...

Sobre algas, generalmente Fucus o Laminaria....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/obelia-geniculata.html>

Micromesistius poutassou (Risso, 1826)

Pez de cuerpo alargado, que alcanza unos 30 cm de longitud cuyas escamas son pequeñas. La mandíbula inferior es algo más grande que la superior y care...

Especie gregaria, vive entre 30 y 1000 m de profundidad, alimentándose de noche cerca de la superficie de pequeños crustáceos....

Desde Noruega a Marruecos y el Mediterráneo. Costa NE de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/micromesistius-poutassou.html>

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)

Cuerpo alargado, de unos 2 m de longitud. Cabeza con hocico largo, afilado; la boca es inferior, y está provista de dientes afilados y puntiagudos, es...

Animal bentónico, que vive hasta profundidades de 400 m. Se alimenta de peces y cefalópodos. Es ovovivípara: el periodo de gestación dura un año, y pa...

Presente en todos los mares templados....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galeorhinus-galeus.html>



Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)

Cuerpo alargado, que mide unos 15 o 16 cm, rara vez alcanza los 20. La cabeza tiene la mandíbula superior mayor a la inferior, y llega más atrás del o...

Es una especie gregaria, que forma bancos pelágicos que al soportar salinidades bajas puede penetrar en estuarios o marismas. Se alimenta de plancton....

Desde Noruega al Mediterráneo y Sudáfrica. Somalia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/engraulis-encrasicolus.html>

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye

Alga cespitosa de hasta unos 30 cm de longitud, fijada al sustrato por una estipe filamentosa, de color verde, pardo o amarillento.. Forma una densa m...

En rocas, bloques, sobre otras algas en el intermareal y sublitoral....

Cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ectocarpus-siliculosus.html>

Clathrina coriacea (Montague, 1818)

Eponja incrustante, de 1 - 3 cm de grosor, de forma irregular con aproximadamente 10 cm de ancho. Está formada por una red de tubos de 0.5 - 1 mm de ...

Vive en aguas poco profundas, en rocas, conchas, bajo los salientes, generalmente en zonas umbrías....

Desde Escandinavia e Islandia al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clathrina-coriacea.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Clathrina clatrus (Porifera)

Crambe crambe (Porifera)



Dysidea avara (Porifera)

Parastichopus regalis (Cuvier, 1817) (Echinodermata)

Raja naevus (Müller & Henle, 1841) (Chordata)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008