



Num. 445. Publicado el 07/10/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cuthona genovae*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 445. Publicado el 07/10/2013

Descripciones de especies

Veronica tenuifolia Asso

Planta sufrútice o planta sufruticulosa, con la base de la parte aérea leñosa o subleñosa. Tallos (5)10-30(45) cm, de ascendentes a erectos, con pelos...

Vive en matorrales, pastizales, piornales, etc., con preferencia por los sustratos básicos, desde los 200 a los 2100 m de altitud....

Endémica de la Península Ibérica, aparece en gran parte del C y NE de España, hasta los Montes de Toledo, sierras levantinas y algunas poblaciones ai...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-tenuifolia.html>

Ramaria subtilis (Coker) Schild

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de hasta 11 cm de altura y 7 cm de anchura, con abundantes ramificaciones que parten de un tronco común, con las rama...

Crece bajo árboles de hoja caduca durante el verano y el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ramaria-subtilis.html>

Cuthona genovae (ODonoghue, 1929)

Pequeño nudibranchio de hasta unos 6 mm de longitud. El cuerpo es translúcido con una pigmentación blanquecina opaca como color de fondo. Presenta un ...

Vive entre algas con hidrozoos de los que se alimenta, como Obelia, Dynamena, Halecium y Sertularella....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-genovae.html>

Chorizopora brongniartii (Audouin, 1826)

Briozoo que forma colonias incrustantes de tamaño medio, con zooides de 0.45-0.6 x 0.25-0.3 mm, ovales y alargados. La pared frontal es tersa, brillan...

Se encuentra sobre sustratos duros, como conchas, pero también sobre algas calcáreas y Posidonia, desde el intermareal hasta unos 100 m de profundidad...



Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chorizopora-brongniartii.html>

Actaea spicata L.

Planta con un rizoma grueso y nudoso, del que surgen raíces fibrosas, de hasta 30 cm. Tallo 30-65 cm, erecto, simple o poco ramoso, desnudo en la base...

Vive en bosques húmedos, dolinas kársticas,... en ambientes nitrófilos, preferentemente esciófila, indiferente al substrato, desde los 700 a los 2200 ...

Eurasia. Mitad N peninsular....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/actaea-spicata.html>

Novedades corológicas

Cuthona genovae (ODonoghue, 1929) (Mollusca)

Nuevo para Galicia - Citado por Marcos Fernández Iglesias en Zona externa de la Ría de Vigo., Cangas. PONTEVEDRA el día 03/10/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/cuthona-genovae-1/16917.html>

Filicupula suboperculata (Döbbeler & P. James) Y.J. Yao & Spooner (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Riofabar, Piloña. ASTURIAS el día 30/09/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/16869.html>

Inocybe rhodiola Bres. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puente de Quinzanas, Pravia. ASTURIAS el día 01/10/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/inocybe-rhodiola-bres-1/16891.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chorizopora brongniartii (Audouin, 1826) (Bryozoa)

Cladonia diversa Asperges (Ascomycota)

Cuthona genovae (ODonoghue, 1929) (Mollusca)



Diodora gibberula (Lamarck, 1822) (Mollusca)

Dolomedes fimbriatus (Walckenaer, 1842) (Arthropoda)

Gegenes nostradamus (Fabricius, 1793) (Arthropoda)

Gloeocystidiellum clavuligerum (Höhn. & Litsch.) Nakasone (Basidiomycota)

Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Hysterographium flexuosum (Schwein.) Sacc. (Ascomycota)

Inocybe margaritispota (Berk.) Sacc. (Basidiomycota)

Inocybe rhodiola Bres. (Basidiomycota)

Lestes viridis Vander Linden, 1825 (Arthropoda)

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) (Arthropoda)

Pholiota populnea (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. (Basidiomycota)

Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

