



## Num. 445. Publicado el 07/10/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Cuthona genovae*. Por Marcos Fernández Iglesias



**Num. 445. Publicado el 07/10/2013**

## Descripciones de especies

### *Veronica tenuifolia* Asso

Planta sufrútice o planta sufruticulosa, con la base de la parte aérea leñosa o subleñosa. Tallos (5)10-30(45) cm, de ascendentes a erectos, con pelos...

Vive en matorrales, pastizales, piornales, etc., con preferencia por los sustratos básicos, desde los 200 a los 2100 m de altitud....

Endémica de la Península Ibérica, aparece en gran parte del C y NE de España, hasta los Montes de Toledo, sierras levantinas y algunas poblaciones ai...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-tenuifolia.html>

### *Ramaria subtilis* (Coker) Schild

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de hasta 11 cm de altura y 7 cm de anchura, con abundantes ramificaciones que parten de un tronco común, con las rama...

Crece bajo árboles de hoja caduca durante el verano y el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ramaria-subtilis.html>

### *Cuthona genovae* (ODonoghue, 1929)

Pequeño nudibranchio de hasta unos 6 mm de longitud. El cuerpo es translúcido con una pigmentación blanquecina opaca como color de fondo. Presenta un ...

Vive entre algas con hidrozooos de los que se alimenta, como Obelia, Dynamena, Halecium y Sertularella....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-genovae.html>

### *Chorizopora brongniartii* (Audouin, 1826)

Briozoo que forma colonias incrustantes de tamaño medio, con zooides de 0.45-0.6 x 0.25-0.3 mm, ovales y alargados. La pared frontal es tersa, brillan...

Se encuentra sobre sustratos duros, como conchas, pero también sobre algas calcáreas y Posidonia, desde el intermareal hasta unos 100 m de profundidad...



Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chorizopora-brongniartii.html>

## *Actaea spicata* L.

Planta con un rizoma grueso y nudoso, del que surgen raíces fibrosas, de hasta 30 cm. Tallo 30-65 cm, erecto, simple o poco ramoso, desnudo en la base...

Vive en bosques húmedos, dolinas kársticas,... en ambientes nitrófilos, preferentemente esciófila, indiferente al substrato, desde los 700 a los 2200 ...

Eurasia. Mitad N peninsular....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/actaea-spicata.html>

## **Novedades corológicas**

### *Cuthona genovae* (ODonoghue, 1929) (Mollusca)

Nuevo para Galicia - Citado por Marcos Fernández Iglesias en Zona externa de la Ría de Vigo., Cangas. PONTEVEDRA el día 03/10/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/cuthona-genovae-1/16917.html>

### *Filicupula suboperculata* (Döbbeler & P. James) Y.J. Yao & Spooner (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Riofabar, Piloña. ASTURIAS el día 30/09/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/16869.html>

### *Inocybe rhodiola* Bres. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puente de Quinzanas, Pravia. ASTURIAS el día 01/10/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/inocybe-rhodiola-bres-1/16891.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Chorizopora brongniartii* (Audouin, 1826) (Bryozoa)

### *Cladonia diversa* Asperges (Ascomycota)

### *Cuthona genovae* (ODonoghue, 1929) (Mollusca)



*Diodora gibberula* (Lamarck, 1822) (Mollusca)

*Dolomedes fimbriatus* (Walckenaer, 1842) (Arthropoda)

*Gegenes nostradamus* (Fabricius, 1793) (Arthropoda)

*Gloeocystidiellum clavuligerum* (Höhn. & Litsch.) Nakasone (Basidiomycota)

*Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

*Hysterographium flexuosum* (Schwein.) Sacc. (Ascomycota)

*Inocybe margaritispora* (Berk.) Sacc. (Basidiomycota)

*Inocybe rhodiola* Bres. (Basidiomycota)

*Lestes viridis* Vander Linden, 1825 (Arthropoda)

*Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792) (Arthropoda)

*Pholiota populnea* (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. (Basidiomycota)

*Psophus stridulus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008