



## Num. 446. Publicado el 14/10/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Philanthus triangulum*. Por José Rafael González López



**Num. 446. Publicado el 14/10/2013**

## Descripciones de especies

*Trochila tini* (Duby) Quél.

Macroscopía. Ascomas erumpentes, gregarios, pulvinados, de hasta 0,5 mm de diámetro, situados en la cara inferior de las hojas húmedas de *Viburnum tinus*...

Este hongo parece ser muy específicamente saprófito de las hojas de *Viburnum tinus*....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trochila-tini.html>

*Pholiota populnea* (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk.

Macroscopía. Sombrero de entre 10 y 20 cm de diámetro, de hemisférico a campanulado, carnoso y apenas mamelonado, con el margen apendiculado. Cutícula...

Aparece de forma saprófita o parásita sobre la madera de árboles planifolios, como chopos, solitaria o en grupos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pholiota-populnea.html>

*Hyssopus officinalis* L.

Planta sufruticosa de 15-52 cm, con tallos erectos, muy foliosos, con indumento de densidad variable, generalmente con pelos retrorsos, de longitud v...

Crece en matorrales aclarados, con frecuencia en lindes y bordes de camino, generalmente en substratobásico, desde los 500 a los 1800 m de altitud....

Región mediterránea europea, NO de África, W y C de Asia. Dispersa en la mitad N de España y en las montañas béticas y penibéticas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hyssopus-officinalis.html>

*Cuthona foliata* (Forbes & Goodsir, 1839)

Nudibranquio de hasta 11 mm de longitud. El cuerpo es translúcido de color amarillento pálido o blanquecino, con pequeños puntos brillantes dispersos ...

Se puede encontrar en el intermareal y fondos rocosos poco profundos, alimentándose de hidrozoos: *Sertularella polyzonias* (L.), *Abietinatira abietina* ...



Se distribuye por la costa atlántica europea hasta el sur de Noruega, también se puede encontrar en el Mar Mediterráneo....

Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-foliata.html>

*Cotesia glomerata* (Linnaeus, 1758)

Los *Cotesia glomerata* adultos son unas pequeñas avispas de aproximadamente 7 mm, de color oscuro con aspecto de hormigas voladoras o pequeñas moscas. ...

Los adultos nada más salir de sus capullos se aparean y las hembras ponen los huevos en el interior de orugas de mariposa (preferiblemente de los pri...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cotesia-glomerata.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Atypus affinis* (Eichwall, 1830) (Arthropoda)

*Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Carpocoris pudicus* (Poda, 1761) (Arthropoda)

*Cotesia glomerata* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Cuthona foliata* (Forbes & Goodsir, 1839) (Mollusca)

*Hebeloma hetieri* Boud. (Basidiomycota)

*Muschampia proto* (Ochsenheimer, 1816) (Arthropoda)

*Myrianida fasciata* Milne Edwards, 1845 (Annelida)

*Philanthus triangulum* (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

*Polistes gallicus* Linnaeus, 1761 (Arthropoda)

*Polistes semenowi* Morawitz, 1889 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



*Trochila tini* (Duby) Quél. (Ascomycota)

*Tubaria romagnesiana* Arnolds (Basidiomycota)

*Ummidia picea* Thorell, 1875 (Arthropoda)

## **Artículos**

### **Fundamentos de nutrición**

Por Aida Lorenzo Corchón

ISSN 1887-5068



9 771887 506008