



Num. 45. Publicado el 17/10/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Bolboschoenus maritimus*. Por José Luis Porto Torres



Num. 45. Publicado el 17/10/2005

Descripciones de especies

Sertularia cupressina Linnaeus, 1758

Hidroideo colonial formado por un eje delgado de hasta 50 cm de longitud, que se ramifica de forma alterna hasta 2 veces, dando a la colonia aspecto d...

En conchas, piedras, otros hidrozooos, a veces en cangrejos en sustratos generalmente arenosos, hasta unos 100 m....

Desde el Canal de la Mancha al norte de España....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sertularia-cupressina.html>

Punctaria latifolia Greville

Alga de 15 - 30 cm de longitud, aplanada, sin estipe, no ramificada, semejante a una hoja, frágil, con muescas en el extremo a veces. Los talos fértil...

En rocas, piedras, conchas (lapas generalmente), en zonas calmadas del intermareal e infralitoral....

Desde Noruega al Mediterráneo. NE y NO de América, Uruguay, Japón, Australia y Nueva Zelanda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/punctaria-latifolia.html>

Peringia ulvae (Pennant, 1777)

Concha de 5 - 6 mm de altura con 6 o 7 vueltas de espira, poco abombadas, de forma cónica alargada y con el ápice redondeado. Concha delgada, con el l...

En fango, zonas arenosas, lugares generalmente salobres, como estuarios, hasta unos 20 m de profundidad, pero es más abundante en el intermareal....

Desde el Norte de Europa a Senegal y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peringia-ulvae.html>

Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)

Blénido de unos 12 - 15 cm de longitud, de cuerpo alargado, no muy comprimido lateralmente. En la cabeza son muy característicos 2 tentáculos supraorbi...



Vive en fondos rocosos, hasta unos 25 m de profundidad, en zonas ligeramente expuestas....

Del Cantábrico a Namibia, Mediterráneo SO. Argentina....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/parablennius-pilicornis.html>

Nemertesia antennina (Linnaeus, 1767)

Hidroideo colonial, formado por una mata de unos 50 ejes no ramificados, amarillentos, de hasta 25 cm de altura, que crecen de un grupo filamentosos de...

En conchas y piedras del sublitoral hasta unos 100 m, en lugares donde se acumula arena y fango....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nemertesia-antennina.html>

Gibbula magus (Linnaeus, 1758)

Concha de unos 2 - 3 cm de altura, con 7 - 8 vueltas de espira, siendo estas abombadas y con aspecto de escaleras. Superficie de las vueltas desiguale...

En costas rocosas, arenosas, hasta 10 o 20 m de profundidad....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gibbula-magus.html>

Cutleria multifida (Turner) Greville

Alga cuyo talo está formado por láminas erectas, planas, de color amarillento, más o menos pardo, que están fijadas al sustrato por un disco basal y q...

Vive en rocas, conchas, en otras algas como *Cystoseira*, en el infralitoral....

Toda Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Chile....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cutleria-multifida.html>

Cerebratulus fuscus McIntosh, 1873

Gusano de unos 15 m de longitud; su cabeza es apuntada, abombada, con profundas hendiduras de color rojo y 4 - 13 ojos a cada lado; la probóscide



o tr...

En arena o grava conchífera, algas, rizoides de kelps hasta unos 100 m de profundidad....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cerebratulus-fuscus.html>

Bougainvillea ramosa (van Beneden, 1844)

Hidrozoos colonial de hasta 10 cm de altura, fijado por un estolón ramificado. De este sale un eje que se ramifica bastante, cuyas ramas se disponen al...

En piedras, rocas, algas calcáreas, otros hidrozoos, madera, hasta unos 40 m de profundidad....

Desde el Báltico sur al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bougainvillea-ramosa.html>

Aphia minuta (Risso, 1810)

Pez de cuerpo comprimido, de unos 6 cm de longitud y color translúcido. Las escamas están dispuestas en líneas laterales de unas 20 - 25 escamas cada ...

Forma bancos bastante densos, alimentándose principalmente de crustáceos....

Presente en todos los mares europeos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aphia-minuta.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brama brama (Bonnaterre, 1788) (Chordata)

Glycera rouxi (Annelida)

Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) (Mollusca)

Prostheceraeus roseus (Platyhelminthes)

