



## Num. 459. Publicado el 13/01/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Raphitoma concinna*. Por Marcos Fernández Iglesias



**Num. 459. Publicado el 13/01/2014**

## Descripciones de especies

### *Thymus zygis* Loefl.

Planta sufruticosa de 10-30 cm, erguido, decumbente y radicante, con tallos ascendentes, generalmente rojizos, pubescentes, con pilosidad muy variable...

Tomillares o matorrales, encinares aclarados, sabinares, melojares o pinares, en substratos calizos, margas, granitos, arenas graníticas, cuarcitas, p...

Península Ibérica y N de Marruecos. Toda la Península Ibérica, exceptuando la cornisa cantábrica y algunas provincias litorales mediterráneas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thymus-zygis.html>

### *Poa bulbosa* L.

Planta herbácea perenne, cespitosa. Vainas basales engrosadas a modo de bulbo. Tallos erectos o geniculado ascendentes, de 5-40 cm de longitud, con 2-...

Vive en pastos soleados, lugares removidos y nitrogenados, cunetas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....

Aparece en el N, centro, SO, SE y E de Europa, N de África, Macaronesia, Asia templada y tropical, Australia, Norteamérica y el sur de Sudamérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/poa-bulbosa.html>

### *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce

Hierba erecta, decumbente o ascendente, glabrescente. Tallos 8-40(80) cm, con indumento seríceo, escaso. Hojas hasta de 15 cm, con 1-9 pares de folíol...

Crece en pastizales de terófitos, en substrato silíceo, desde el nivel del mar a los 600(800) m de altitud....

Aparece en el O de Europa (Inglaterra), región mediterránea, Canarias y Madeira. Dispersa en la mitad O de la Península Ibérica—más rara en el E- y ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ornithopus-pinnatus.html>

### *Carex pulicaris* L.

Laxamente cespitosa. Tallos (4)10-25(40) cm, obtusamente trígono o subcilíndricos, lisos. Hojas 0,2-0,9 mm de anchura, de longitud menor o rara



vez ma...

Vive en turberas generalmente en áreas de montaña, desde los 40 a los 1900(2350) m de altitud....

Endemismo del N, C y O de Europa: Islas Británicas, Islandia, península Escandinava, Dinamarca, Alemania, Austria, antigua Checoslovaquia, Polonia, E...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-pulicaris.html>

## *Adonis pyrenaica* DC.

Planta herbácea vivaz de 10-45 cm, apenas pubescente. Hojas con limbo bien desarrollado; las basales, grandes, claramente pecioladas y, como las caulin...

Crece en pastos pedregosos y roquedos montanos, calcícola preferentemente, desde los 1500 a los 2600 m....

Cordillera Cantábrica, Pirineos y una localidad en los Alpes Marítimos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/adonis-pyrenaica.html>

## **Novedades corológicas**

*Pseudonectria rousseliana* (Mont.) Wollenw. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. ASTURIAS el día 12/01/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pseudonectria-rousseauiana-mont-wollenw-1/17791.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Buthus ibericus* Lourenço & Vachon, 2004 (Arthropoda)

*Idotea linearis* (Linnaeus, 1763) (Arthropoda)

*Lachnus roboris* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Pseudonectria rousseliana* (Mont.) Wollenw. (Ascomycota)

*Raphitoma concinna* (Scacchi, 1836) (Mollusca)



*Scarites cyclops* Crotch, 1871 (Arthropoda)

