



Num. 46. Publicado el 24/10/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Littorina neritoides*. Por César Fernández González



Num. 46. Publicado el 24/10/2005

Descripciones de especies

Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh

Alga de 15 - 40 cm de longitud, de aspecto filamentoso, lisa, con un eje central que se ramifica de forma alterna. En época fértil estas ramas desarro...

En rocas en el infralitoral, hasta unos 60 m de profundidad....

Desde Noruega hasta las Canarias. Brasil y Sudáfrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sporochnus-pedunculatus.html>

Pontobdella muricata Linnaeus, 1758

Sanguijuela de hasta 20 cm de longitud, de cuerpo cilíndrico. La ventosa delantera, con forma de campana o disco, es igual o de mayor tamaño que la tr...

Parasita rayas y torpedos a los que se adhiere con sus ventosas....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pontobdella-muricata.html>

Perforatus perforatus

Bellota de mar con caparazón de hasta 3 cm de diámetro y altura similar, de contorno regular, cónico, con forma de volcán y con la abertura pequeña en...

Vive en el intermareal y sublitoral bajo la zona definida por *Balanus balanoides*, en zonas batidas sobre piedras, rocas, bloques, o estructuras artifi...

Desde Gales a la costa oeste de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/perforatus-perforatus.html>

Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767)

Quitón de unos 2.5 cm de longitud y 1.5 veces más largo que ancho, de forma ovalada, de color pardo, amarillo o verde oliva, con bandeado y parcheado....



En rocas y piedras; es bastante común....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepidochitona-cinerea.html>

Gloiosiphonia capillaris (Hudson) Carmichael

Alga con un disco basal incrustante de unos 3 mm de diámetro, del que salen grupos de frondes de hasta 30 cm de longitud, mucilaginosos pero firmes, y...

Vive en el intermareal en charcas y en el infralitoral hasta unos 5 m de profundidad, en zonas ligeramente expuestas....

Desde Noruega al Mediterráneo. Japón, Alaska y costa NO de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gloiosiphonia-capillaris.html>

Dromia personata (Linnaeus, 1758)

Cangrejo de hasta 5 - 8 cm de longitud, con caparazón abombado, ligeramente más ancho que largo y cubierto de pelos cortos y rígidos que le dan un asp...

En costas rocosas, en el fondo o grutas, hasta 70 m de profundidad, normalmente a menos. Generalmente está cubierto de esponjas que se coloca usando e...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dromia-personata.html>

Codium fragile (Suringar) Hariot

Fronde ramificada dicotómicamente, hasta 25 cm, de textura aterciopelada y esponjosa, formada por muchos filamentos anastomosados, que en conjunto pue...

Sustratos rocosos, charcas, arena y fango del intermareal, pudiendo alcanzar hasta los 20 m. en el sublitoral. Crece fácilmente en ambientes semiexpue...

Codium fragile es una especie originaria del Océano Pacífico, en concreto de las costas de Japón. Se sospecha que la vía de entrada en Europa fue por ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/codium-fragile.html>



Chaetopterus variopedatus (Renier, 1804)

Gusano tubícola, con el cuerpo dividido en 3 regiones, de unos 25 cm de longitud y 2.5 cm de ancho. Es de color amarillo o verdoso pálido, las hembras...

Vive en su tubo enterrado en arena o fango. Al ser molestado emite luminiscencia en su zona central y mucus....

Posiblemente cosmopolita, en Europa presente desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chaetopterus-variopedatus.html>

Balanus balanus Linnaeus, 1758

Bellota de mar con caparazón cónico de unos 3 cm de diámetro, tan alto como ancho y de contorno bastante irregular. El caparazón, cuya base está calci...

En el intermareal y sublitoral, donde llega a grandes profundidades, en rocas, piedras, bloques o incluso conchas (Pecten), y a veces en el casco de l...

Atlántico Norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balanus-balanus.html>

Arthrocladia villosa (Hudson) Duby

Alga de hasta 70 cm de longitud, formada por un eje que se ramifica de forma opuesta en ramas que a su vez portan otras ramillas en verticilos que le ...

En rocas y piedras de zonas arenosas....

Desde Noruega al Mediterráneo, Canarias, Azores, Madeira, Costa este de América del Norte; fue introducida en el sur de Australia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arthrocladia-villosa.html>

