



Num. 46. Publicado el 24/10/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Littorina neritoides*. Por César Fernández González



Num. 46. Publicado el 24/10/2005

Descripciones de especies

Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh

Alga de 15 - 40 cm de longitud, de aspecto filamentoso, lisa, con un eje central que se ramifica de forma alterna. En época fértil estas ramas desarro...

En rocas en el infralitoral, hasta unos 60 m de profundidad....

Desde Noruega hasta las Canarias. Brasil y Sudáfrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sporochnus-pedunculatus.html>

Pontobdella muricata Linnaeus, 1758

Sanguijuela de hasta 20 cm de longitud, de cuerpo cilíndrico. La ventosa delantera, con forma de campana o disco, es igual o de mayor tamaño que la tr...

Parasita rayas y torpedos a los que se adhiere con sus ventosas....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pontobdella-muricata.html>

Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767)

Quitón de unos 2.5 cm de longitud y 1.5 veces más largo que ancho, de forma ovalada, de color pardo, amarillo o verde oliva, con bandeado y parcheado....

En rocas y piedras; es bastante común....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepidochitona-cinerea.html>

Gloiosiphonia capillaris (Hudson) Carmichael

Alga con un disco basal incrustante de unos 3 mm de diámetro, del que salen grupos de frondes de hasta 30 cm de longitud, mucilaginosos pero firmes, y...



Vive en el intermareal en charcas y en el infralitoral hasta unos 5 m de profundidad, en zonas ligeramente expuestas....

Desde Noruega al Mediterráneo. Japón, Alaska y costa NO de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gloiosiphonia-capillaris.html>

Dromia personata (Linnaeus, 1758)

Cangrejo de hasta 5 - 8 cm de longitud, con caparazón abombado, ligeramente más ancho que largo y cubierto de pelos cortos y rígidos que le dan un asp...

En costas rocosas, en el fondo o grutas, hasta 70 m de profundidad, normalmente a menos. Generalmente está cubierto de esponjas que se coloca usando e...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dromia-personata.html>

Codium fragile (Suringar) Hariot

Fronde ramificada dicotómicamente, hasta 25 cm, de textura aterciopelada y esponjosa, formada por muchos filamentos anastomosados, que en conjunto pue...

Intermareal, en charcas, rocas, arena y fango, y en sublitoral hasta los 20 m....

Desde Noruega al oeste de África. Japón, China, Filipinas, costa oeste de Norte y Centroamérica, Chile, Australia y Nueva Zelanda. Especie invasora, c...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/codium-fragile.html>

Chaetopterus variopedatus (Renier, 1804)

Gusano tubícola, con el cuerpo dividido en 3 regiones, de unos 25 cm de longitud y 2.5 cm de ancho. Es de color amarillo o verdoso pálido, las hembras...

Vive en su tubo enterrado en arena o fango. Al ser molestado emite luminiscencia en su zona central y mucus....

Posiblemente cosmopolita, en Europa presente desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chaetopterus-variopedatus.html>

Balanus perforatus Brugiére, 1789



Bellota de mar con caparazón de hasta 3 cm de diámetro y altura similar, de contorno regular, cónico, con forma de volcán y con la abertura pequeña en...

Vive en el intermareal y sublitoral bajo la zona definida por *Balanus balanoides*, en zonas batidas sobre piedras, rocas, bloques, o estructuras artifi...

Desde Gales a la costa oeste de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balanus-perforatus.html>

Balanus balanus Linnaeus, 1758

Bellota de mar con caparazón cónico de unos 3 cm de diámetro, tan alto como ancho y de contorno bastante irregular. El caparazón, cuya base está calci...

En el intermareal y sublitoral, donde llega a grandes profundidades, en rocas, piedras, bloques o incluso conchas (*Pecten*), y a veces en el casco de l...

Atlántico Norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balanus-balanus.html>

Arthrocladia villosa (Hudson) Duby

Alga de hasta 70 cm de longitud, formada por un eje que se ramifica de forma opuesta en ramas que a su vez portan otras ramillas en verticilos que le ...

En rocas y piedras de zonas arenosas....

Desde Noruega al Mediterráneo, Canarias, Azores, Madeira, Costa este de América del Norte; fue introducida en el sur de Australia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arthrocladia-villosa.html>

