



## Num. 47. Publicado el 31/10/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Serapias cordigera*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 47. Publicado el 31/10/2005**

## Descripciones de especies

### *Sagartiogeton undatus* (Müller, 1778)

Anémone de hasta 12 cm de altura y 6 cm de diámetro. La columna carece de verrugas y es de color pardo y en la zona superior puede ser amarillento, ro...

En el submareal, sobre piedras o conchas, o enterradas en arena o grava de gravas o agujeros de las rocas....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sagartiogeton-undatus.html>

### *Pisidia longicornis* (Linnaeus, 1767)

Pequeño cangrejo de unos 10 mm de longitud, de color rojo pardo, verde oliva o marrón, liso y sin pelos. El caparazón es casi circular, pero en la par...

Bajo piedras, rizoides de algas, en el briozoo Pentapora, hasta unos 100 m de profundidad. Hembras ovígeras entre febrero y abril y julio y septiembre...

Desde Noruega al Mediterráneo. También en el Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pisidia-longicornis.html>

### *Philine aperta* (Linnaeus, 1767)

Molusco de cuerpo de unos 2 cm de longitud y la mitad de ancho, con forma de diamante redondeado, de color blanco translúcido a amarillo pálido con pu...

En zonas arenosas, fangosas, en aguas poco profundas, enterrado generalmente. Se alimenta de pequeños poliquetos, bivalvos y del erizo Echinociamus....

Costa atlántica de Europa y África. Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/philine-aperta.html>

### *Peachia cylindrica* (Reid, 1848)

Anémone vermiforme, de columna cilíndrica, alargada, cuya base no es adhesiva. La columna es de color rosa pardo translúcido, con 12 líneas



verticales...

Vive enterrada en arena o fango, hasta unos 30 o 50 m de profundidad. Se contrae rápidamente....

Desde las Islas Británicas y el sur de Noruega a Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peachia-cylindrica.html>

## *Grateloupia filicina* (Lamouroux) Agardh

Alga con frondes que surgen de un disco basal de unos 20 mm de diámetro, que de jóvenes son simples o de ramificación dicótoma, pero que luego adquiere...

Epilítica, hasta 10 m de profundidad, a veces en lugares arenosos o con aporte de agua dulce....

Desde Noruega a Sudáfrica, Mediterráneo, Brasil, Perú, SE asiático....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/grateloupia-filicina.html>

## *Echinocyamus pusillus* (Müller, 1776)

Erizo de pequeño tamaño, midiendo tan sólo 8 - 12 mm de longitud. El cuerpo es ovalado, plano, algo cóncavo en la parte oral, con ambulacros petaloide...

En zonas arenosas o de grava fina, hasta unos 1000 m de profundidad, en costas generalmente calmadas....

Desde Noruega a Sierra Leona incluido el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echinocyamus-pusillus.html>

## *Dumontia contorta* (Gmelin) Ruprecht

Alga roja de unos 2 - 25 cm de longitud, cuyas frondes surgen de un disco basal de unos 2 cm de diámetro. Las frondes son cilíndricas y estrechas de j...

Epilítica, a veces epífita, desde el intermareal. Soporta salinidades bajas....

Desde Escandinavia a Portugal, costa NO y NE de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dumontia-contorta.html>

## *Cythere lutea* Müller, 1785



Crustáceo ostracodo, caracterizado por tener el cuerpo muy modificado, con el caparazón semejante a la concha de los bivalvos en el que el animal se i...

En el intermareal, a veces en charcas de marea, y aguas por lo general poco profundas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cythere-lutea.html>

## *Argonauta argo* Linnaeus, 1758

Cefalópodo con un notable dimorfismo sexual, ya que las hembras miden 10 - 12 cm de longitud y los machos tan sólo 1 cm. La hembra tiene una concha bl...

Generalmente nadando en zonas próximas a la costa, pero a veces se encuentra reptando en el fondo....

Cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/argonauta-argo.html>

## *Acteon tornatilis* (Linnaeus, 1758)

Concha de 2 - 3 cm de longitud, con forma de tonel y con 7 - 8 vueltas de espira, en la que el animal se puede retraer por completo, de color rosa o p...

En zonas arenosas o fangosas, generalmente calmadas, donde se alimenta de gusanos tubícolas como *Lanice conchilega* y *Owenia fusiformis*. Suele presenta...

Todas las costas europeas menos el Báltico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acteon-tornatilis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Antho involvens* (Porifera)

*Auxis rochei* (Risso, 1810) (Chordata)

*Eunice torquata* Quatrefages, 1866 (Annelida)

*Musculus discors* (Linnaeus, 1767) (Mollusca)

