



Num. 470. Publicado el 31/03/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cytinus hypocistis*. Por Iñaki Rojo Legarra



Num. 470. Publicado el 31/03/2014

Descripciones de especies

Vicia pyrenaica Pourr.

Hierba perenne, con rizoma estolonífero ramificado y turiones con hojas escuamiformes, trepadora, glabra o con pelos de c. 0,2 mm, esparcidos y erect...

Vive en pastos alpinos, pastizales sobre suelos pedregosos o arenosos, gleras y fisuras de rocas, desde los 1000 a los 2550 m de altitud....

España y Francia (Alpes y Pirineos). Montañas del N, C y SE de España....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-pyrenaica.html>

Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757)

Araña de unos 6-8 mm de longitud los machos y 10-13 las hembras, de cuerpo aplanado. Prosoma de color pardo grisáceo con un ribete blanquecino y fino e...

Suele aparecer en las cercanías de zonas donde haya agua, en las rocas o en puentes o casas de riberas, pero también zonas más secas. La tela es circular...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/larinioides-sclopetarius.html>

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel

Hierba anual, erecta, ascendente o procumbente, unicaule, casi glabra. Tallo (1)3-15(20) cm, erecto, filiforme, muy ramificado, generalmente glabro, ...

Crece en comunidades de terófitos en márgenes de arroyo, lagunas y charcas estacionales, en substratos húmedos y ácidos -arenas silíceas y granitos-,...

S y O de Europa y N de África. Gran parte de la Península Ibérica -ocasional en el tercio E- y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/exaculum-pusillum.html>

Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M.B. Crespo

Rizoma de 12-25 mm de diámetro, con numerosas raíces fibrosas, flexibles, no engrosadas. Tallos 14-80 x 0,2-0,4 cm, simples o rara vez ramosos, subci...



Crece en juncales y pastizales higrófilos, a menudo en suelos más o menos salinos de marjales o saladares, tanto en el litoral como en áreas interior...

Oeste de la Región Mediterránea, desde el S de Francia y N de Italia hasta Túnez. Principalmente en la mitad oriental de la Península Ibérica, tanto...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chamaeiris-reichenbachiana.html>

Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803)

Concha de hasta 6.5 x 2.3 mm, alta, estrecha, cónica, con hasta 14 vueltas aplanadas con suturas profundas. Escultura a base de estrías espirales y co...

Se encuentra sobre esponjas, como *Halichondria panacea* e *Hymeniacidon perleve*, asociada generalmente con *Lomentaria*, *Corallina* y otras algas rojas....

Desde las Azores y el Mediterráneo a Noruega....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cerithiopsis-tubercularis.html>

Novedades corológicas

Ramularia ari Fautrey (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Oviedo, Oviedo. ASTURIAS el día 24/03/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ramularia-ari-fautrey-1/18240.html>

Sporormiella teretispora S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Fondo, Carreño. ASTURIAS el día 30/03/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/sporormiella-teretispora-s-i-ahmed-cain-1/18293.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombus sylvarum Linnaeus, 1761 (Arthropoda)

Bombylius discolor Mikan, 1796 (Arthropoda)

Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M.B. Crespo (Magnoliophyta)

Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) (Chordata)



Cystobasidium fimetarium (Schumach.) P. Roberts (Basidiomycota)

Delitschia marchalii Berl. & Voglino (Ascomycota)

Homalenotus quadridentatus (Cuvier, 1795) (Arthropoda)

Leucojum aestivum L. (Magnoliophyta)

Lithobius variegatus Leach, 1817 (Arthropoda)

Ramularia ari Fautrey (Ascomycota)

Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Sporormiella longisporopsis S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)

Sporormiella minima (Auersw.) S. I. Ahmed & Cain (Ascomycota)

Sporormiella teretispora S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)

