



Num. 473. Publicado el 21/04/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Timon lepidus*. Por José Luis Porto Torres



Num. 473. Publicado el 21/04/2014

Descripciones de especies

Vicia angustifolia L.

Hierba anual, trepadora, hirtula o glabra, con pelos hasta de 0,5 mm. Tallo hasta de 80 cm, ascendentes o procumbentes, más o menos angulosos.

Hojas...

Crece en pastizales, herbazales y campos de cultivo, desde el nivel del mar a los 2000 m....

Casi toda Europa, C y O de Asia, Siberia, N de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias). Muy común en todo el territorio....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-angustifolia.html>

Teucrium capitatum subsp. *capitatum*

Planta sufruticosa de (10) 20 - 35 (45) cm, erecta, rara vez con rizomas, a veces aromática, con braquiblastos invernantes laterales en la base de los...

Vive en matorrales degradados en laderas pedregosas y eriales, preferentemente en yesos o margas, pero también en arenas y sustratos ácidos, desde e...

Aparece en el C y SO de Asia, S de Europa y N de África. Ampliamente distribuida por la Península Ibérica e Islas Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-capitatum-subsp-capitatum.html>

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

Geométrido de 24-28 mm de envergadura, fácil de identificar por sus alas blancas marcadas con zonas pardas o negruzcas a lo largo del borde. La cantid...

El adulto es activo durante la noche. La larva se alimenta por lo general de chopos y sauces, pero también se ha encontrado en abedul y avellano. Pasa...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lomaspilis-marginata.html>

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos unglados, de forma de consola, ampliamente fijados al sustrato, de 10-30 cm de anchura y 5-20 cm de espesor. Superfi...



Crece sobre madera viva o muerta tanto de coníferas como de planifolios originando una podredumbre marrón que puede acabar con la vida del árbol....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fomitopsis-pinicola.html>

Clonopsis gallica (Charpentier, 1825)

Insecto palo, de cuerpo estrecho y alargado, áptero. Hembras de 60 a 70 mm, con antenas cortas, formadas por 12-13 artejos de 3-4 mm de longitud; pata...

Vive durante primavera y verano en zonas frondosas con matorrales, especialmente donde haya rosales o zarzales. Las hembras pueden poner huevos por pa...

Sur de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clonopsis-gallica.html>

Novedades corológicas

Unguiculella tityri (Velen.) Huhtinen & Spooner (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pola de Somiedo, Somiedo. ASTURIAS el día 20/04/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/unguiculella-tityri-velen-huhtinen-spooner-1/18511.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombardioidea stercoris (DC.) N. Lundq. (Ascomycota)

Exapion ulicis (Forster 1771) (Arthropoda)

Lixus iridis Olivier, 1807 (Arthropoda)

Pissodes castaneus (De Geer, 1775) (Arthropoda)

Testudo hermanni Gmelin, 1789 (Chordata)

Thecotheus holmskjoldii (E. C. Hansen) Eckblad (Ascomycota)

Unguiculella tityri (Velen.) Huhtinen & Spooner (Ascomycota)



Artículos

Los glúcidos

Por Lorenzo Corchón, A.

