



## Num. 473. Publicado el 21/04/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Timon lepidus*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 473. Publicado el 21/04/2014**

## Descripciones de especies

### *Vicia angustifolia* L.

Hierba anual, trepadora, hirtula o glabra, con pelos hasta de 0,5 mm. Tallo hasta de 80 cm, ascendentes o procumbentes, más o menos angulosos.  
Hojas...

Crece en pastizales, herbazales y campos de cultivo, desde el nivel del mar a los 2000 m....

Casi toda Europa, C y O de Asia, Siberia, N de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias). Muy común en todo el territorio....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-angustifolia.html>

### *Teucrium capitatum* subsp. *capitatum*

Planta sufruticosa de (10) 20 - 35 (45) cm, erecta, rara vez con rizomas, a veces aromática, con braquiblastos invernantes laterales en la base de los...

Vive en matorrales degradados en laderas pedregosas y eriales, preferentemente en yesos o margas, pero también en arenas y sustratos ácidos, desde e...

Aparece en el C y SO de Asia, S de Europa y N de África. Ampliamente distribuida por la Península Ibérica e Islas Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-capitatum-subsp-capitatum.html>

### *Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758)

Geométrido de 24-28 mm de envergadura, fácil de identificar por sus alas blancas marcadas con zonas pardas o negruzcas a lo largo del borde. La cantid...

El adulto es activo durante la noche. La larva se alimenta por lo general de chopos y sauces, pero también se ha encontrado en abedul y avellano.  
Pasa...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lomaspilis-marginata.html>

### *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos unglados, de forma de consola, ampliamente fijados al sustrato, de 10-30 cm de anchura y 5-20 cm de espesor.  
Superfi...



Crece sobre madera viva o muerta tanto de coníferas como de planifolios originando una podredumbre marrón que puede acabar con la vida del árbol....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fomitopsis-pinicola.html>

## *Clonopsis gallica* (Charpentier, 1825)

Insecto palo, de cuerpo estrecho y alargado, áptero. Hembras de 60 a 70 mm, con antenas cortas, formadas por 12-13 artejos de 3-4 mm de longitud; pata...

Vive durante primavera y verano en zonas frondosas con matorrales, especialmente donde haya rosales o zarzales. Las hembras pueden poner huevos por pa...

Sur de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clonopsis-gallica.html>

## **Novedades corológicas**

### *Unguiculella tityri* (Velen.) Huhtinen & Spooner (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pola de Somiedo, Somiedo. ASTURIAS el día 20/04/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/unguiculella-tityri-velen-huhtinen-spooner-1/18511.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Bombardioidea stercoris* (DC.) N. Lundq. (Ascomycota)

*Exapion ulicis* (Forster 1771) (Arthropoda)

*Lixus iridis* Olivier, 1807 (Arthropoda)

*Pissodes castaneus* (De Geer, 1775) (Arthropoda)

*Testudo hermanni* Gmelin, 1789 (Chordata)

*Thecotheus holmskjoldii* (E. C. Hansen) Eckblad (Ascomycota)

*Unguiculella tityri* (Velen.) Huhtinen & Spooner (Ascomycota)



## Artículos

### **Los glúcidos**

Por Lorenzo Corchón, A.

ISSN 1887-5068



9 771887 506008