



Num. 491. Publicado el 25/08/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Mesembryanthemum crystallinum*. Por Iñaki Rojo Legarra



Num. 491. Publicado el 25/08/2014

Descripciones de especies

Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)

Chinche de 7-8.5 mm de longitud, con el cuerpo de color gris pardusco y con el abdomen a menudo verdoso. La cresta transversal de la parte anterior de...

Vive en zonas secas abiertas donde se alimenta de plantas, especialmente compuestas. Es frecuente en zonas industrializadas abandonadas....

Desde los países escandinavos al Mediterráneo hasta Siberia y Asia Central....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stictopleurus-punctatonervosus.html>

Mesembryanthemum crystallinum L.

Planta herbácea, pluricaule, verde o rojiza, densamente cubierta de grandes papilascristalinas, bastante prominentes. Tallos gruesos, postrados, con...

Roquedos, arenales o terrenos arcillosos del litoral....

Nativa en Sudáfrica; subespontáneo naturalizada en la región mediterránea, Macaronesia, Australia y California. Subespontánea en puntos dispersos ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mesembryanthemum-crystallinum.html>

Euphrasia minima Jacq.

Hierbas anuales, hasta de 15(30) cm, verdes, raramente purpúreas, glabras opelosas, con pelos tectores. Tallos erectos, poco ramificados. Hojas con 2...

Vive en zonas húmedas de montaña, preferentemente en vertientes con elevada saturación atmosférica (en las laderas orientadas al W que atrapan las nie...

Montañas del C y S de Europa, desde Portugal hasta la Península Balcánica y los Apeninos. NE de Portugal, tercio N de España y S del Sistema Ibérico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphrasia-minima.html>

Chaenorhinum minus subsp. *minus*

Hierba anual, de (1)6-35(40) cm, dispersamente glandular-pubescente, con indumentoheterótrico formado por pelos glandulíferos y tectores de



0,3-0,5 ...

Pedregales, baldíos, desmontes, cunetas, taludes y márgenes de pistas forestales, de ordinario ensuelos removidos, subnitrófilos, secos y soleados, ...

Europa -excepto en su extreoseptentrional-, NO de África -Atlas Medio- y SO de Asia; ampliamente naturalizado en otras regionestempladas.
Dispers...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-minus-subsp-minus.html>

Ceraleptus lividus Stein, 1858

Chinche de 10-11.5 mm de longitud, de color general pardo rojizo, finamente granulado, fácil de identificar por las rayas oscuras que recorren el cuer...

Los adultos emergen y se aparean durante la primavera. Las larvas se pueden encontrar en junio y agosto alimentándose de *Trifolium* y *Lotus*.
Adultos du...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ceraleptus-lividus.html>

Novedades corológicas

Entoloma jahnii Wölfel & Winterh. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de valgrande, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 24/08/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//19717.html>

Ophiobolus pseudaffinis Petr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 18/08/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophiobolus-pseudaffinis-petr-1/19676.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Entoloma jahnii Wölfel & Winterh. (Basidiomycota)

Fallenia fasciata (Fabricius, 1805) (Arthropoda)

Mesembryanthemum crystallinum L. (Magnoliophyta)



Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

