



Num. 499. Publicado el 20/10/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gyps fulvus*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 499. Publicado el 20/10/2014

Descripciones de especies

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard

Macroscopía. Sombrero de 3.5-5 cm de diámetro, acampanado, convexo, con un mamelón ancho y bajo, con la cutícula de ocre pardo a parda, con tintes ros...

Crece en dunas marítimas y suelos aluviales arenosos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepiota-brunneolilacea.html>

Hypselodoris picta (Schultz in Philippi 1836)

Hypselodoris picta es la especie de doridáceo de mayor tamaño del género, ya que puede alcanzar hasta (19 cm. El color de fondo del cuerpo es grisáceo...

Vive en aguas poco profundas donde se alimenta de esponjas del género *Ircinia* o *Dysidea* (según los autores) de las cuales secuestran sus metabolitos s...

Atlántico occidental desde Florida a Brasil y el Caribe. En el Atlántico este desde la Península Ibérica hasta el África occidental y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypselodoris-picta.html>

Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer

Macroscopía. Sombrero de 10-20 mm de diámetro, al principio hemisférico, luego de convexo a aplanado y ligeramente deprimido en el centro o con un peq...

Es una especie rara que aparece en turberas acidófilas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gymnopilus-fulgens.html>

Digitalis obscura subsp. *obscura* L.

Planta sufrútice que alcanza hasta 60(80) cm, con tallo simple o poco ramificado, glabro y de color pardo-rojizo. Las hojas son lanceoladas o linear-la...

Habita en zonas de matorral seco, roquedos, laderas pedregosas y grietas de peñascos, calcícola; se encuentra en rangos altitudinales que van desde



lo...

Endémica de la Península Ibérica, se distribuye principalmente en la mitad oriental, siendo más abundante en el SE....

Por MARTÍNEZ SAGARRA, Gloria & JURADO GÜETO, Silvia

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/digitalis-obscura-subsp-obscura.html>

Cortinarius talus Fr.

Macroscopía. Sombrero de 40-80 mm de diámetro, de hemisférico a convexo, con el margen regular e involuto, de color meloso pálido a ocráceo, casi blan...

Crece en bosques de panifolios, especialmente de hayas, robles y abedules, prefiriendo terrenos ácidos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-talus.html>

Novedades corológicas

Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. ASTURIAS el día 15/10/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/gymnopilus-fulgens-j-favre-maire-singer-1/20208.html>

Leucopaxillus gentianeus (Quéll.) Kotl. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coria de Arriba, Belmonte de Miranda. ASTURIAS el día 19/10/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//20248.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Cantharellula umbonata (J. F. Gmel.) Singer (Basidiomycota)

Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer (Basidiomycota)

Hypocrea lixii Pat. (Ascomycota)

Lactarius uvidus (Fr.) Fr. (Basidiomycota)



Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. (Basidiomycota)

Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829 (Arthropoda)

Tephroclype boudieri (Kühner & Romagn.) Derbsch (Basidiomycota)

Ulex minor Roth (Magnoliophyta)

