



## Num. 501. Publicado el 03/11/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Asterophora lycoperdoides*. Por Julio César González Fernández



**Num. 501. Publicado el 03/11/2014**

## Descripciones de especies

*Russula olivacea* (Schaeff.) Pers.

Macroscopía. Sombrero de hasta 18 cm de diámetro, hemisférico al principio, luego convexo y finalmente extendido y deprimido en el centro; margen obtu...

Crece en grupos bajo frondosas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-olivacea.html>

*Ramaria flaccida* (Fr.) Bourdot

Macroscopía. Basidiomas coraloides de hasta 40 mm de diámetro y 50 mm de altura, con un tronco basal de 2-5 mm de grosor, con la base blanquecina y re...

Crece preferentemente en bosques de coníferas, siendo rara en los de planifolios....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ramaria-flaccida.html>

*Percnon gibbesi* (H. Milne-Edwards, 1853)

Cangrejo de hasta 3 cm de longitud. Caparazón ovalado y aplanado dorsoventralmente, más largo que ancho, con los bordes laterales con cuatro espinas. ...

Se trata de una especie que habita la zona litoral y sublitoral de costas rocosas. Se alimenta principalmente de algas....

Esta especie habita en ambas costas del Océano Atlántico: de Florida (Estados Unidos) a Brasil por el oeste y de Madeira y Azores hasta el Golfo de Gu...

Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/percnon-gibbesi.html>

*Euphorbia cyparissias* L.

Planta perenne, glabra. Rizoma horizontal, raramente oblicuo, hasta de 6 mm de diámetro. Tallos de 5-60 cm, erectos o ascendentes, herbáceos, simples...

Vive en pastos y claros de bosque, herbazales húmedos, matorrales, márgenes y taludes de carreteras y pistas forestales, bordea los prados; sobre suel...



Aparece en el O, S y C de Europa, alcanza por el E hasta el C y S de Rusia; introducida en América del Norte. Cuadrante NE de la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-cyparissias.html>

## *Capnodis tenebrionis* (Linnaeus, 1758)

Coleóptero de 15 - 30 mm de longitud, las hembras un mayor tamaño, de coloración general negro mate. La cabeza es ancha y se encuentra bajo el pronoto...

Ataca a diversas especies de rosáceas silvestres y cultivadas de hueso (almendro, melocotonero, ciruelo...). Completa su ciclo evolutivo en dos años...

Se extiende en el área mediterránea, aunque actualmente ocupa también áreas del interior más continentales (su extensión es cada vez mayor, favorecido...

Por GONZÁLEZ ARANDA, Irene

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/capnodis-tenebrionis.html>

## **Novedades corológicas**

### *Scotophaeus blackwalli* (Thorell, 1871) (Arthropoda)

Nuevo para Asturias - Citado por Esteban Guerra Martín en Salamir, Cudillero. ASTURIAS el día 27/10/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/scotophaeus-blackwalli-1/20352.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Aspitates gilvaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

### *Cicindela maroccana* Fabricius, 1801 (Arthropoda)

### *Corythucha ciliata* Say, 1832 (Arthropoda)

### *Inocybe phaeodisca* Kühner (Basidiomycota)

### *Limacella glioderma* (Fr.) Maire (Basidiomycota)

### *Nyctophila reichii* (Jacquelin du Val, 1859) (Arthropoda)

### *Russula farinipes* Romell (Basidiomycota)



*Tricholoma columbetta* (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Uroctea durandi* (Latreille, 1809) (Arthropoda)

