



## Num. 506. Publicado el 08/12/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Crepipatella dilatata*. Por José Rafael González López



**Num. 506. Publicado el 08/12/2014**

## Descripciones de especies

### *Vicia pannonica* Crantz

Hierba anual, trepadora, hirtula, con pelos de 0,2-0,5 mm, erectos, ligeramentetuberculados. Tallos hasta de 100 cm, erectos, ascendentes o procumbe...

Cultivos, pastizales y claros de formaciones leñosas, desde los 500 a los 1550 m....

C y S de Europa, SO de Asia y NO de África. Mitad N de la España peninsular excepto el NO, muy rara en zonas montañosas del S y del E....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-pannonica.html>

### *Minuartia recurva* (All.) Schinz & Thell.

Planta glabra, más o menos glandulosa -glandulosidad casi constante en la inflorescenciay parte superior del tallo, más excepcional en las hojas de ...

Pastos psicroxerófilos sobre rocas cuarcíticas, intrusivas o metamórficas pobres en bases, calcífuga, desde los 1000 a los 3000 m de altitud....

Montañas del S de Europa y SW de Asia, con una estación aislada en el S de Irlanda. Cordillera Cantábrica, Pirineos, N del Sistema Ibérico, Serra do ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/minuartia-recurva.html>

### *Lactarius pterosporus* Romagn.

Macroscopía. Sombrero de 3-9 cm de diámetro, convexo, con el centro deprimido o giboso; margen enrollado inicialmente, luego extendido y ondulado. Cut...

Vive en bosques de planifolios, especialmente hayas durante el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-pterosporus.html>

### *Crepipatella dilatata* (Lamarck, 1822)

Concha convexa de forma variable, baja o alta, ovalada-redondeada y tamaño de hasta 72mm de longitud ( Marincovich , 1973). El ápice es pronunciado y...

Habita en los niveles intermareales, encontrándose adherida a rocas, y se puede encontrar como epibionte adherida a otros moluscos, así como a



valvas...

Es originaria del Atlántico y Pacífico de Sudamérica, habiéndose detectado su presencia en Galicia (2005) y en Asturias (2010), habiendo llegado a Esp...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crepipatella-dilatata.html>

## *Cortinarius olidus* J. E. Lange

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 3-10 cm de diámetro, inicialmente hemisférico, luego convexo y aplanado, con el margen enrollado con restos...

Crece en bosques de planifolios generalmente hayedos, durante el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-olidus.html>

## **Novedades corológicas**

### *Neriere clathrata* (Sundevall, 1830) (Arthropoda)

Nueva para Asturias - Citado por Esteban Guerra Martin en Soto de Luiña, Cudillero. ASTURIAS el día 06/12/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/neriere-clathrata-1/20758.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Crepipatella dilatata* (Lamarck, 1822) (Mollusca)

### *Cryptocephalus bipunctatus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

### *Hebeloma velutipes* Bruchet (Basidiomycota)

### *Neriere clathrata* (Sundevall, 1830) (Arthropoda)

### *Nidularia deformis* (Willd.) Fr. (Basidiomycota)

### *Pholiota spumosa* (Fr.) Singer (Basidiomycota)

### *Xerula pudens* (Pers.) Singer (Basidiomycota)

