



## Num. 510. Publicado el 05/01/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Synema globosum*. Por Mikel Tapia Arriada



**Num. 510. Publicado el 05/01/2015**

## Descripciones de especies

### *Thalictrum tuberosum* L.

Planta glabra, de 30-55 cm, con un rizoma delgado, corto y bordeado por raíces napiformes. El tallo es escapiforme, erecto, simple o poco ramoso. Las h...

Vive en formaciones herbáceas sobre margas y suelos muy calizos, pastos repetidamente incendiados, entre los 100 y los 1700 m de altitud...

Aparece en el S y SO de Francia y España, donde vive en el valle del Ebro, parte de Levante, valles del Duero y Tajo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thalictrum-tuberosum.html>

### *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.

Hierba herbácea perenne, con pelos estrellados y algunos simples mucho más largos o, a veces -sobre todo los individuos que crecen en lugares muy umbr...

Fisuras de rocas silíceas de montaña; 1300-3300 m....

Península Ibérica y N de África. Cordillera Cantábrica, Montes de León, sistemas Central e Ibérico y Sierra Nevada...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/murbeckiella-boryi.html>

### *Leucopaxillus gentianeus* (Quél.) Kotl.

Macroscopía. Sombrero de 6-12 cm de diámetro, carnoso, plano convexo, en ocasiones algo deprimido, con el margen incurvado y estriado acanalado; cutíc...

Crece en bosques de coníferas y planifolios durante el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucopaxillus-gentianeus.html>

### *Echinopartum barnadesii* (Graells) Rothm.

Arbusto (1)1,5-2 m, poco espinoso, muy ramificado, verde-grisáceo en la floración. Ramas opuestas o verticiladas, con 8 costillas en forma de T, serí...

Crece en piornales o zonas rocosas de alta montaña, sobre litosuelos acidófilos, desde los 1400 a los 2000(2250) m de altitud. VI-VII(VIII). Sierra...



Endémico de la Sierra de Gredos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echinopartum-barnadesii.html>

*Acacia longifolia* (Andrews) Willd.

Árbol o arbusto de 1-8 m, erecto, inerme, con corteza agrietada y cenicienta. Ramillas angulosas, glabras o pubescentes cuando jóvenes. Hojas sin estí...

Aparece en las dunas litorales, hasta los 100 m de altitud....

Originaria del SE de Australia. N y W de la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acacia-longifolia.html>

## **Novedades corológicas**

*Peziza moseri* Aviz.-Hersh. & Nemlich (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 31/12/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/peziza-moseri-aviz-hersh-nemlich-1/20943.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (Magnoliophyta)

*Aspidapion radiolus* (Marsham, 1802) (Arthropoda)

*Drypta dentata* (Rossi, 1790) (Arthropoda)

*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. (Magnoliophyta)

*Eucalyptus delegatensis* R. T. Baker (Magnoliophyta)

*Eucalyptus robusta* Sm. (Magnoliophyta)

*Geopora nicaeensis* (Boud.) M. Torre (Ascomycota)

*Isotomurus maculatus* (Schaeffer 1896) (Arthropoda)



*Octosporopsis nicolai* (Maire) U. Lindemann (Ascomycota)

*Peleteria rubescens* (Robineau-Desvoidy, 1830) (Arthropoda)

*Peziza moseri* Aviz.-Hersh. & Nemlich (Ascomycota)

*Sclerogaster gastrosporioides* Pilát & Svrcek (Basidiomycota)

*Singa lucina* (Audouin, 1826) (Arthropoda)

## **Artículos**

### **Orgánulos energéticos de la célula**

Por Lorenzo Corchón, A.

