



Num. 511. Publicado el 12/01/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Perichaena depressa*. Por Mikel Tapia Arriada



Num. 511. Publicado el 12/01/2015

Descripciones de especies

Valerianella dentata (L.) Pollich

Hierba anual con tallos de 3-30(40) cm, ramificados en la mitad superior o desde la base, con 3-6 dicotomías, rara vez simples, glabrescentes o con m...

Pastos terofíticos, ruderal y arvense, indiferente edáfica, desde el nivel del mar a los 1550(1790) m de altitud....

Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias), Europa -excepto el N-, NW de África, S de Rusia, y Cy SO de Asia. Dispersa por la mitad N de la Península ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/valerianella-dentata.html>

Tricholoma pseudonictitans Bon

Macroscopía. Sombrero de 5-7 cm, de convexo a plano convexo, con un umbo ancho, con el margen enrollado y débilmente acanalado, con la cutícula lisa, ...

Crece en grupos pequeños asociado a Abies y Picea y otras coníferas pero también bajo planifolios como Quercus y Castanea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-pseudonictitans.html>

Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm.

Macroscopía. Sombrero de 40-80 mm, de globoso a hemisférico al principio, luego aplanado; superficie lisa o algo desigual, sedoso brillante en tiempo ...

Hongo que crece de forma gregaria en bosques de Quercus, más raramente en Fagus sylvatica, en suelos neutros o ácidos, termófilos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-atropurpurea.html>

Ranunculus pyrenaicus L.

Planta vivaz, de (3)5-20(25) cm, con tallo peloso apicalmente, con raíces cilíndricas, amarillentas, fibrosas o algo engrosadas. Hojas basales de oblo...

Neveros, cervunales y pastos de Festuca eskia, en substrato silíceo o suelos descalcificados, desde los 1700 a los 3000 m. ...

Pirineos centrales y orientales, más localizada en los occidentales....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-pyrenaeus.html>

Nepeta nepetella L.

Hierba 20-98 cm, perenne, hermafrodita, con rizoma \pm vertical, sin raíces tuberosas. Tallos macizos, con pelos tectores de 0,1-2,5 mm, patentes o unc...

Matorrales, pie de cantiles, bordes de hayedo, márgenes de caminos y arroyos, baldíos y zonas pedregosas, desde los 50 a los 3100 m de altitud...

SO de Europa y NO de África. C y E de España....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nepeta-nepetella.html>

Novedades corológicas

Geopora nicaeensis (Boud.) M. Torre (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Selorio, Villaviciosa. ASTURIAS el día 05/01/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/geopora-nicaeensis-boud-de-la-torre-1/20966.html>

Sclerogaster gastrosporioides Pilát & Svrcek (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 05/01/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//20963.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Caenoplana coerulea Moseley, 1877 (Platyhelminthes)

Epistrophe eligans (Harris, 1780) (Arthropoda)

Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner (Basidiomycota)

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

Perichaena depressa Lib. (Mycetozoa)



Quercus petraea (Matt.) Liebl. (Magnoliophyta)

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008