



## Num. 512. Publicado el 19/01/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Euphrosine foliosa*. Por Marcos Fernández Iglesias



**Num. 512. Publicado el 19/01/2015**

## Descripciones de especies

### *Ranunculus gouanii* Willd.

Planta perenne, de (3)6-37(60) cm, con un rizoma grueso, oblicuo, oblongo, generalmente muy peloso en el ápice, con pelos 1,5-2,5(3) mm; raíces fibro...

Pastos de montaña, lugares majadeados y bosques aclarados, en cualquier tipo de sustrato; generalmente de 1100 a 2350 m de altitud....

Pirineos, Cordillera Cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-gouanii.html>

### *Muehlenbeckia complexa* (A. Cunn.) Meisn.

Subarbusto trepador, muy ramificado, con ramas entrelazadas densas cuando carece de soporte. Tallos delgados, lisos o estriados, acastañado-rojizos; ...

Planta cultivada en parques y jardines y asilvestra. Indiferente a la naturaleza ácida, neutra o básica del sustrato. Tolera la sequía del terreno por...

Originaria de Nueva Zelanda; cultivada en jardines y naturalizada en muchas regiones....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/muehlenbeckia-complexa.html>

### *Leucoagaricus melanotrichus* (Malençon & Bertault) Trimbach

Macroscopía. Sombrero de 1.5-3 cm de diámetro, al principio globoso campanulado, luego plano convexo, con mamelón central; margen excendente, algo cre...

Crece en bosques termófilos mediterráneos durante el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-melanotrichus.html>

### *Euphrosine foliosa* Audouin & Milne-Edwards, 1833

Poliqueto de cuerpo alargado y ovalado, convexo dorsalmente, de hasta 30 mm de longitud y formado por 36 segmentos, de color anaranjado a rojizo. Pres...

Vive en fondos de barro, grava, piedras y corales, desde el intermareal hasta mayores profundidades....



Atlántico NE, Mediterráneo y Mar Rojo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphrosine-foliosa.html>

*Cortinarius turmalis* Fr.

Macroscopía. Sombrero de 50-100 cm de diámetro, hemisférico al principio, luego de convexo a aplanado y ligeramente umbonado; superficie lisa, mate, s...

Crece de forma gregaria generalmente en bosques de *Fagus sylvatica*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-turmalis.html>

## **Novedades corológicas**

*Helminthosphaeria triseptata* A.N. Mill. (Ascomycota)

Primera cita para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Burutain, . NAVARRA el día 15/01/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/helminthosphaeria-triseptata-a-n-mill-huhndorf-j-four-1/21021.html>

*Lentithecium lineare* (E. Müll. ex Dennis) K.D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. ASTURIAS el día 18/01/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//21031.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Attagenus trifasciatus* (Fabricius 1787) (Arthropoda)

*Euphrosine foliosa* Audouin & Milne-Edwards, 1833 (Annelida)

*Helminthosphaeria triseptata* A.N. Mill. (Ascomycota)

*Lentithecium lineare* (E. Müll. ex Dennis) K.D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang (Ascomycota)

*Pogonognathellus longicornis* (Müller, 1776) (Arthropoda)

