



## Num. 514. Publicado el 02/02/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Rhagio tringarius*. Por José Rafael González López



**Num. 514. Publicado el 02/02/2015**

## Descripciones de especies

*Marasmiellus virgatocutis* Robich, Esteve-Rav. & G. Moreno

Macroscopía. Sombrero de 1-2 cm de diámetro, al principio hemisférico, luego plano convexo y con el centro deprimido, con el margen arrugado y estriad...

Crece sobre ramas caídas de encinas, alcornocos, castaños, en zonas de ámbito mediterráneo durante el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/marasmiellus-virgatocutis.html>

*Daphne gnidium* L.

Arbusto hasta de 2 m de altura, muy ramificado. Tallos densamente foliados en gran parte de su longitud, cubiertos de pelos cortos (0,1-0,25 mm) y ad...

Encinares, alcornocales, coscojares y matorrales de sustitución -en especial por incendio- de dichos bosques; 0-1400 m....

S de Europa (desde la Península Ibérica hasta Grecia), N de África (Rif y regiones litorales de Argelia y Túnez) e Islas Canarias. Abundante en el O,...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/daphne-gnidium.html>

*Corvus corone* Linnaeus, 1758

La corneja común es un conocido córvido de 44-51 cm de longitud y 84-100 cm de envergadura. Su plumaje es completamente negro, con reflejos metálicos ...

Al igual que la mayor parte de los córvidos, la corneja común es un ave muy versátil que le permite ocupar una gran diversidad de hábitats, desde las ...

Se distribuye por toda la región Paleártica y falta en las zonas frías del norte de Siberia. Se han considerado dos subespecies en Europa, corone en...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/corvus-corone.html>

*Acer platanoides* L.

Árbol hasta de 30 m, caducifolio, polígamo, de copa amplia, laxa, redondeada. Ramas patentes; corteza lisa, verde-grisácea o verde-rojiza, cuando jov...



Bosques umbrosos de caducifolios, bosques de ribera, fondos de barranco, etc., en ambiente húmedo; en suelos frescos y fértiles; 50-1800 m....

Gran parte de Europa -hacia el S, en las montañas-, el Cáucaso, Anatolia y el N de Irán; como naturalizado en Gran Bretaña, Holanda y E y W deNortea...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acer-platanoides.html>

## *Acer negundo* L.

Árbol hasta de 20 m, caducifolio, dioico, de copa reducida, laxa, a menudoirregular. Ramas de patentes a erecto-patentes; corteza lisa, pruinosa, de...

Bordes de arroyo, río, embalse, choperas, etc.; en ambientes más o menos frescos, sobre todo riparios, y en zonasalteradas; 10-1200 m....

Originaria del N y C de América -desde Canadá hasta el S deGuatemala-; ampliamente naturalizado en las zonas templadas de todo el mundo: E de China ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acer-negundo.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Acer palmatum* Thunb. (Magnoliophyta)

*Callionymus maculatus* Rafinesque, 1810 (Chordata)

*Cettia cetti* (Temminck, 1820) (Chordata)

*Ethmia aurifluella* (Hübner, 1810) (Arthropoda)

*Tenthredo bifasciata* O. F. Muller 1766 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

