



Num. 515. Publicado el 09/02/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Xylaria violaceorosea*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 515. Publicado el 09/02/2015

Descripciones de especies

Prunella laciniata (L.) L.

Hierba 10-37 cm, de base leñosa, estolonífera. Tallos con indumento denso en la parte superior, con pelos antrorsos o casi aplicados, a veces con pel...

Pastos en bosques aclarados o matorrales, en substratos húmedos, indiferente edáfica; 100-1700 (1850) m....

C y S de Europa, N de África y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/prunella-laciniata.html>

Octosporopsis nicolai (Maire) U. Lindemann

Macroscopía. Apotecios superficiales, gregarios, inicialmente globulosos, más tarde urceolados, finalmente anchamente turbinados, de subcupuliformes a...

Los apotecios de *Octosporopsis nicolai* parecen fructificar en los talos de la hepática que reciben una elevada insolación ya que en ninguna ocasión hem...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/octosporopsis-nicolai.html>

Certhia familiaris Linnaeus, 1758

El agateador norteño es un ave de unos 12 cm de longitud y 17-21 cm de envergadura, pequeña, con un pico fino y curvo, con un plumaje que lo hace pasa...

Vive generalmente en bosques alpinos maduros en zonas donde no hay sequía durante el periodo estival, como aquellos de abetos, hayas, roble albar, pin...

Aparece en gran parte del hemisferio norte, extendiéndose por las regiones templadas y boreales de Norteamérica, Asia y Europa. En Europa se encuentra...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/certhia-familiaris.html>

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Árbol hasta de 30 m, en general dioico. Tronco de corteza grisácea, más o menos clara, lisa o agrietada en los ejemplares más viejos; ramas de un



par...

Es frecuente en bordes de carretera, de camino, de vía de tren, taludes, solares abandonados, barrancos, bosques de ribera, etc., donde se asilvestra ...

Originario de China central, Taiwán y N de Corea, se ha naturalizado en casi todo el Mundo. En la Península Ibérica, como naturalizada, por todo el te...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ailanthus-altissima.html>

Acer monspessulanum L.

Arbolillo o arbusto hasta de 8(15) m, caducifolio, polígamo, de copa reducida, densa, globosa. Ramas más o menos péndulas; corteza lisa y grisácea, a...

Vive en quejigares, encinares, melojares, robledales, bosques mixtos de carácter submediterráneo o subatlántico, etc., gleras, roquedos, pies de cant...

La subespecie típica, en el S de Europa -hastael O de Alemania-, Córcega, Cerdeña, Sicilia, el Magreb y Anatolia; como naturalizada, en Austria; la...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acer-monspessulanum.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Albizia julibrissin Durazz. (Magnoliophyta)

Alcea rosea L. (Magnoliophyta)

Allium ampeloprasum L. (Magnoliophyta)

Allium cepa L. (Magnoliophyta)

Alnus incana (L.) Moench (Magnoliophyta)

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

Bovista limosa Rostr. (Basidiomycota)

Carabus basilicus Chevrolat, 1836 (Arthropoda)

Chrysocarabus lineatus Dejean, 1826 (Arthropoda)



Protaetia oblonga (Gory & Percheron, 1833) (Arthropoda)

Xylaria violaceorosea Fournier J., Román A., Balda J., Rubio E (Ascomycota)

