



## Num. 521. Publicado el 23/03/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Chalcides striatus*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 521. Publicado el 23/03/2015**

## Descripciones de especies

### *Kernera saxatilis* (L.) Rehb.

Planta herbácea perenne de 5-40 cm, con pelos aplicados en la parte basal -roseta foliar y, almenos, en la parte inferior de los tallos-. Cepa peque...

Grietas de rocas calizas; 850-2700 m....

C y S de Europa. N de España...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/kernera-saxatilis.html>

### *Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz

Planta perenne, cespitosa; rizoma de entrenudos largos, de 0,5-0,75 mm de diámetro, de rojizo a pardo oscuro, cubierto de escamas translúcidas cuand...

Prados húmedos, turberas y bordes de laguna; indiferente edáfica; 630-2910 m....

América, Eurasia y N de África (Atlas). Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistemas Ibérico y Central y cordilleras Béticas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eleocharis-quinqueflora.html>

### *Cantharellula umbonata* (J. F. Gmel.) Singer

Macroscopía. Sombrero de 15-30 mm de diámetro, convexo cuando es joven, pronto aplanado y de infundibuliforme a umbilicado, con el centro a menudo más...

Crece en lugares húmedos de bosques, donde son frecuentes musgos, generalmente formando grupos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cantharellula-umbonata.html>

### *Arenaria grandiflora subsp. incrassata* (Lange) C. Vicioso

Planta cespitosa, de hasta 25 cm. Tallos más o menos erectos o colgantes en sitios sombreados, con pelos cortos, retrorsos, eglandulosos, acompañados...

Vive en grietas y fisuras de rocas, pastos sobre suelo esquelético, preferentemente en substrato calizo. desde los 500 a los 1500 m de altitud....

Es una planta endémica de la Cordillera Cantábrica....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-grandiflora-subsp-incrassata.html>

## *Aethionema thomsonianum* J. Gay

Planta perenne, sufruticosa, con tallos prostrado-ascendentes, en buena partesubterráneos -o en las grietas-; vástagos del año cortos.Hojas densamen...

Crece en pedregales calizos, siendo muy rara, desde los 1500 a los 2150 m de altitud....

Alpes occidentales, Cordillera Cantábrica y Nde África? Peña Ubiña, Espigüete....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aethionema-thomsonianum.html>

## **Novedades corológicas**

### *Lophiostoma fuckelii* Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 20/03/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-fuckelii-sacc-1/21546.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Bubas bison* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

*Carabus galicianus* Gory, 1839 (Arthropoda)

*Citrus limon* (L.) Burm.f. (Magnoliophyta)

*Cordyline australis* (G. Forst.) Endl. (Magnoliophyta)

*Hexaplex trunculus* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

*Lophiostoma fuckelii* Sacc. (Ascomycota)

*Microthyrium gramineum* E. Bommer, M. Rousseau & Sacc. (Ascomycota)

*Obama marmorata* (Schultze & Müller, 1857) (Platyhelminthes)

ISSN 1887-5068



*Obama nungara* Carbayo, Álvarez-Presas, Jones & Riutort, 2016 (Platyhelminthes)

*Phalium granulatum* (Von Born, 1778) (Mollusca)

