



## Num. 522. Publicado el 30/03/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Pisidium casertanum*. Por César Fernández González



**Num. 522. Publicado el 30/03/2015**

## Descripciones de especies

### *Russula melliolens* Quéf.

Macroscopía. Sombrero de 5-10 cm de diámetro, hemisférico al principio, luego aplanado o deprimido en el centro; superficie lisa o algo desigual, roja...

Hongo que crece solitario o gregario en bosques de caducifolios, como robles, más raramente hayas o carpes, en zonas termófilas con suelos secos, de n...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-melliolens.html>

### *Inocybe tenebrosa* Quéf.

Macroscopía. Sombrero de 10-32 mm de diámetro, cónico-convexo, convexo a casi aplanado, con o sin umbo, con el margen inflexo de joven, luego recto, c...

Vive bajo frondosas, como Quercus, Corylus avellana y Carpinus betulus....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inocybe-tenebrosa.html>

### *Delphinium halteratum* subsp. *verdunense*

Planta anual, con tallos de 10-80 cm, erectos, más o menos ramificados, generalmente adpreso-pubéroloshasta la antesis.Hojas basales generalmente au...

Bordes de camino, lugares incultos....

Mediterráneo central y occidental. C, N y O de la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/delphinium-halteratum-subsp-verdunense.html>

### *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood

Planta perenne de 10-70(100) cm, con uno o varios tallos; éstos, ramificados, hirtos en la base.Hojas basales de 2-16 x 0,2-3,5 (incluidos los dientes...

Sobre todo tipo de substratos y medios, desde el nivel del mar a los 2900 m de altitud....

Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/biscutella-valentina.html>

## *Arenaria erinacea* Boiss.

Planta pulviniforme o densamente cespitosa, con cepa leñoso-tortuosa muyramificada. Tallos pelosos, con entrenudos generalmente más cortos que las h...

Vive en crestas, cimas, parameras y laderas ventosas, preferentemente en suelos crioturbados y calizos, desde los 900 a los 2200 m de altitud...

Planta endémica de la Península Ibérica, en las montañas de clima continental del N, C, E y S, desde Lugo hasta la Sierra de Grazalema, en Cádiz....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-erinacea.html>

## **Novedades corológicas**

### *Microthyrium gramineum* E. Bommer, M. Rousseau & Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Selorio, Villaviciosa. ASTURIAS el día 23/03/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/microthyrium-gramineum-e-bommer-m-rousseau-sacc/21591.html>

### *Ostearius melanopygius* (Pickard-Cambridge, O., 1879) (Arthropoda)

Nueva para Asturias - Citado por Esteban Guerra Martín en Salamir, Cudillero. ASTURIAS el día 23/03/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/ostearius-melanopygius-1/21577.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Antrodia xantha* (Fr.) Ryvarden (Basidiomycota)

### *Oestophora silvae* Ortiz de Zárate López, 1962 (Mollusca)

### *Ostearius melanopygius* (Pickard-Cambridge, O., 1879) (Arthropoda)

### *Palaeostigus palpalis* (Latreille, 1804) (Arthropoda)

### *Pisidium casertanum* (Poli, 1791) (Mollusca)

### *Psylliodes marcidus* (Illiger, 1807) (Arthropoda)



*Strophosoma capitatum* (De Geer, 1775) (Arthropoda)

*Thanatophilus rugosus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008