



Num. 528. Publicado el 11/05/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Vieitezia luzmurubae*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 528. Publicado el 11/05/2015

Descripciones de especies

Thlaspi perfoliatum L.

Planta herbácea anual, glabra, glauca, uni o pluricaule, con tallos de 4-30(40) cm, erectos, simples o ramificados. Hojas enteras o denticuladas; las b...

Arvense y ruderal, o en pastizales terofíticos, zonas pedregosas y peñas calizas; (170) 500-2000 (2500) m. ...

Europa, N de Africa, O y C de Asia, Siberia, introducida en el N de América. En casi toda la Península Ibérica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thlaspi-perfoliatum.html>

Scrophularia auriculata L.

Hierba perenne, rizomatosa, pubescente-glandulosa o glabra. Tallos hasta de 250cm, profusamente ramificados desde la base, glabros o laxamente pubes...

Higrófila, en bordes de ríos, arroyos, fuentes y charcas; 0-1400 m....

Oeste y SO de Europa, Italia y Marruecos; introducida en México. O, N y E de la Península Ibérica e Islas Baleares...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-auriculata.html>

Ero furcata (Villers, 1789)

Pequeña araña de 2.5-3 mm los machos y 3.5-4.8 mm las hembras. Prosoma pardo amarillento, con la región ocular y una banda ancha en el margen más oscu...

Ero furcata vive en árboles, arbustos, vegetación baja y en la hojarasca en una gran cantidad de hábitats. Se alimenta de otras arañas constructoras d...

Presente en toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ero-furcata.html>

Cucurbita pepo L.

Planta herbácea anual, áspera, setoso-espinulosa, con tallos generalmente largos y postrados o cortos y más o menos erectos, angulosos, de ordinario l...



Cultivada como hortaliza....

Ampliamente cultivada en las regiones de clima favorable de todo el mundo. En las zonas de clima frío su adaptación es posible gracias a su rápido cr...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cucurbita-pepo.html>

Alyssum granatense Boiss. & Reut.

Planta anual, 5-10(25) cm, pelosa, verde o de un verde ceniciento, de ordinario ramificada desde la base. Tallos floríferos erecto-ascendentes. Hojas...

Ruderal, en todo tipo de medios abiertos, sobre calizas, esquistos o granitos: campos de cereal, barbechos, olivares, pendientes erosionadas; 250-180...

Península Ibérica y N de África. Por casi toda la Península. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alyssum-granatense.html>

Novedades corológicas

Pirottaea trichostoma (Kirschst.) E. Müll. & Arx (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Eros, Quirós. ASTURIAS el día 08/05/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//22023.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Betula populifolia Marshall (Magnoliophyta)

Dasypogon diadema (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. (Magnoliophyta)

Ophiobolus ponticus Petr. (Ascomycota)

Pirottaea trichostoma (Kirschst.) E. Müll. & Arx (Ascomycota)

Trachys troglodytiformis Obenberger, 1916 (Arthropoda)

Uca tangeri (Eydoux, 1835) (Arthropoda)



Vieitezia luzmurubae Junoy, Andrade & Giribet, 2010 (Nemertina)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008