



(c) Ricardo Roberto Fdez.

Num. 539. Publicado el 27/07/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Ceratothoa oestroides*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 539. Publicado el 27/07/2015

Descripciones de especies

Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz

Planta perenne, de hasta de 10 cm de altura, sufruticosa, más o menos tapizante; dioica -excepcionalmente con alguna flor hermafrodita en pies mascul...

Brezales y pastizales de alta montaña, sobre suelos esqueléticos; (850)1200-2070 m....

Cordillera Cantábrica, montes del NW peninsular y Serra da Estrela....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thymelaea-coridifolia-subsp-dendrobryum.html>

Hormathophylla spinosa (L.) P. Küpfer

Planta leñosa sufruticosa, de 5-25(40) cm de altura, muy ramificado desde la base, espinosa, que forma almohadillas de 20-60 cm de diámetro o más. Ra...

Pedregales y roquedos calcáreos y, más raramente, silíceos en todas las exposiciones, también en matorrales sobre sustratos muy someros; 100-3400 m....

Región mediterránea occidental. Principalmente en la mitad oriental de España -excluido el extremo NE-, también en el Sistema Ibérico y en la Cordill...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hormathophylla-spinosa.html>

Centaurea avilae Pau

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -brácteas involucrales con espinita apical nada punzante-, de un verde grisáce...

Fisuras y pequeños rellanos algo nitrificados en rocas graníticas; 1700-2200 m. ...

Endemismo del centro de España, que aparece en las sierras de Gredos y Béjar....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-avilae.html>

Antirrhinum graniticum Rothm.

Hierba perenne, de ordinario glandular-pubescente, con indumento heterótrico formado por pelos tectores y glandulíferos de 0,3-0,6 mm,



pluricelulares...

Figuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y muros, en calizas, yesos, pizarras, esquistos y granitos; 30...

Gran parte de la Península Ibérica -falta solo en el N y el E-, desde Portugal, hasta el C de España...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-granicum.html>

Allium paniculatum L.

Hierba perenne con un bulbo de 15-26 x 11-19 mm, más o menos ovoide, solitario, por lo general sin bulbillos; túnica externa coriácea, lisa, grisácea...

Márgenes de bosque, matorrales, pastizales, repisas de roquedo, bordes de arroyo y saladares; 0-2900 m. ...

S y E de Europa -desde Francia hasta el S de Rusia-, N de África, Canarias, Madeira y Oriente Medio; introducido en el N de América. Casi toda la Pen...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/allium-paniculatum.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bupleurum rigidum L. (Magnoliophyta)

Bupleurum rigidum subsp. *rigidum* L. (Magnoliophyta)

Ceratothoa oestroides (Risso, 1816) (Arthropoda)

Echinops sphaerocephalus L. (Magnoliophyta)

