



Num. 55. Publicado el 26/12/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Halimium lasianthum subsp. alyssoides*. Por José Luis Porto Torres



Num. 55. Publicado el 26/12/2005

Descripciones de especies

Rossia macrosoma (Delle Chiaje, 1830)

Pequeño cefalópodo de hasta 85 mm de longitud del manto (normalmente entre 20 y 60 mm), lo que representa más o menos 1/3 de la longitud total del cue...

En fondos arenosos y fangosos, hasta los 600 m de profundidad. Tiene hábitos sedentarios, si bien realiza migraciones durante la época de reproducción...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo y Golfo de Guinea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rossia-macrosoma.html>

Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787)

Cangrejo de hasta 4 cm de longitud, de caparazón cuadrangular y sin muchas marcas. Rostro liso y amplio, más largo que media anchura del caparazón, co...

En la zona de marea, bajo piedras, especialmente en zonas de rompiente, como los bloques de puertos no muy sucios. Hembras ovígeras entre mayo y agost...

Desde las Islas Británicas al Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pachygrapsus-marmoratus.html>

Kirchenpaueria pinnata (Linnaeus, 1758)

Hidrozoos de hasta 6 cm de altura, formado por ejes erectos, unidos por un estolón ramificado, rectos o ligeramente zigzageantes, con hidroclados alter...

Sobre algas, conchas o estructuras superficiales, hasta unos 100 m de profundidad....

Desde las Islas Británicas a Sudáfrica y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/kirchenpaueria-pinnata.html>

Geryon longipes Edwards, 1881

Cangrejo de caparazón hexagonal, de hasta 6 cm de longitud, más ancho que largo, caracterizado por tener 3 dientes en el borde anterolateral,



siendo m...

Vive a más de 300 m de profundidad. Hembras ovígeras entre enero y mayo....

Desde Noruega al Mediterráneo occidental y las Canarias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geryon-longipes.html>

Cryptopleura ramosa (Hudson) Kylin ex Lily Newton

Alga roja formada por talos postrados o erectos; los primeros son cintas lobuladas y fijadas por numerosos hapterios y de las que se desarrollan los t...

En estipes de *Laminaria hyperborea* o sobre algas calcificadas del tipo *Corallina*, tanto en zonas expuestas como calmadas....

Desde Noruega al Mediterráneo y el oeste de África. También en Brasil....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cryptopleura-ramosa.html>

Clavelina nana (Lahille, 1890)

Ascidia colonial con individuos libres, de 2 cm de altura, pero conectados entre si por la base por una red de estolones gelatinosos. Aunque se pueden...

En piedras, algas, conchas, hasta los 50 m. Se encuentran también sobre estructuras artificiales portuarias, como los pantalanes....

Desde el Sur de Noruega a las Azores y Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clavelina-nana.html>

Bopyrus squillarum Latreille, 1802

Isópodo parásito cuya hembra mide hasta 12 mm de longitud y el macho tan sólo alcanza los 2 mm y vive en la cámara incubatoria de la hembra. Cuerpo de...

En la cavidad branquial de *Palaemon serratus*. Los huevos permanecen encerrados en esta cavidad un cierto tiempo....

Atlántico y Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bopyrus-squillarum.html>

Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)



Cangrejo de hasta 5 cm de longitud, de caparazón poligonal. En el rostro tiene 4 dientes y en el borde anterolateral 5, siendo el último bastante más ...

En aguas profundas, desde 100 m hasta los 1000 m de profundidad. Hembras ovígeras desde febrero a mayo....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bathynectes-maravigna.html>

Apolemia uvaria (Lesueur, 1815)

Curioso animal, formado por un flotador o neumatóforo lleno de gas, al que está unido un estolón contráctil libre que se mantiene normalmente horizont...

Normalmente en aguas superficiales, alimentándose de otros animales gelatinosos como salpas o hidromedusas, formando una red en la que quedan atrapada...

Desde las Islas Británicas a Sudáfrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/apolemia-uvaria.html>

Alloteuthis subdulata (Lamarck, 1798)

Cefalópodo de unos 210 mm de longitud total y 140 de longitud de manto, de cuerpo fusiforme, alargado y puntiagudo, con una cola de más de 6 mm de lon...

En fondos de arena o fango hasta los 500 m de profundidad. Realiza migraciones a la costa para reproducirse, donde pone huevos en cápsulas ovoides fij...

Desde Noruega al Golfo de Guinea y el Mediterráneo occidental....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alloteuthis-subdulata.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calystegia sepium (L.) R. Br. (Magnoliophyta)

Convolvulus arvensis L. (Magnoliophyta)

Orobanche minor Sm. (Magnoliophyta)



Pinus pinaster Aiton (Pinophyta)

Thymosia guernei (Porifera)

