



Num. 550. Publicado el 12/10/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Helvella ephippium*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 550. Publicado el 12/10/2015

Descripciones de especies

Polygonum persicaria L.

Planta anual, herbácea, con tallos de (10)30-70(80) cm, erectos o postrado-ascendentes, más o menos ramificados, poco engrosados en los nudos. Hojas d...

Suelos alterados, cultivos, cunetas, acequias o bordes de corrientes; 0-1500 m. ...

Cosmopolita. Frecuente en gran parte de la Península Ibérica, Mallorca y Menorca....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-persicaria.html>

Helvella ephippium Lév.

Apotecios de 5-10 mm de diámetro y 5-10 mm de altura, de irregularmente lobulado a forma de silla de montar, en ocasiones lateralmente comprimido inic...

Crece en el humus de bosques de planifolios o coníferas como Picea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helvella-ephippium.html>

Gentiana cruciata L.

Hierba perenne 10-40 cm, con rizoma vertical hasta de 25 mm de diámetro, densamente cubierto en la parte distal por los restos fibrosos de las hojas d...

Pastizales mesófilos y claros forestales desde el piso montano hasta el subalpino, en substratos calcáreos; 800-2000 m....

Gran parte de Europa, Siberia occidental, Altai y N de AsiaMenor. Cuadrante NE de España: Pirineos y Prepirineo, Sistema Ibérico, Maestrazgo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-cruciata.html>

Curculio elephas (Gyllenhal, 1836)

El gorgojo de las castañas es un insecto que tiene una longitud de 6 a 9 mm; con tegumentos marrones recubiertos dorsalmente con escámulas lanceoladas...

Se desarrolla sobre diversas cupulíferas (Castanea, Quercus) por lo que su hábitat es aquél en donde se encuentren esos árboles. El ciclo general es ...



Se le encuentra en el norte de África, Península Ibérica, centro y sur de Francia, Italia, Balcanes, Suiza y Alemania. En España se encuentra en toda ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/curculio-elephas.html>

Castianeira badia (Simon, 1877)

Araña de hasta 8.5 mm de longitud total. Prosoma. Escudo prosómico de color castaño oscuro (no negro), más pálido en su región central, y provisto de u...

Bajo piedras en zonas cálidas....

Especie endémica del centro-oeste de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/castianeira-badia.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & R.Ferguson (Magnoliophyta)

Curculio elephas (Gyllenhal, 1836) (Arthropoda)

Helianthus xlaetiflorus Pers. (Magnoliophyta)

Lonicera etrusca Santi (Magnoliophyta)

Phymata crassipes (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Protocalliphora azurea (Fallén, 1817) (Arthropoda)

