



## Num. 551. Publicado el 19/10/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Ecballium elaterium*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 551. Publicado el 19/10/2015**

## Descripciones de especies

### *Pinguicula longifolia* Ramond

Hierba perenne, con aparato radical exiguu, que hiberna bajo la forma de yema, con estolones. Hojas suberectas o erectas, pecioladas o subsésiles, de...

Roquedos y travertinos calcáreos rezumantes, también al pie de éstos, covachas, a menudo en lugares umbrosos, en substrato calizo; (500)900-2000 m....

Pirineos centrales...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pinguicula-longifolia.html>

### *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej.

Hierba perenne, de 15-40(58) cm, más o menos densamente cespitosa, sin estolones, con(1)3-8 tallos floridos. Tallos 12-34(52) cm, con (1)2 ó 3(4) ho...

Claros de hayedos y robledales, rara vez en barrancos húmedos de encinares, pastos alpinos o subalpinos o matorrales subalpinos y pastos nitrificados;...

Hemisferio norte. C y N de la Península Ibérica, y Sierra Nevada....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/luzula-multiflora.html>

### *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich.

Planta herbácea, monoica o dioica, perenne, sin zarcillos, procumbente de ordinario, rara vez ascendente; tiene un cepa leñosa en la base. Tallos de 2...

Suelos removidos, barbechos, cunetas, márgenes de caminos, etc....

Región mediterránea, hasta Armenia y Macaronesia. Dispersa por toda la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ecballium-elaterium.html>

### *Cortinarius damascenus* Fr.

Macroscopía. Sombrero de 30-70 mm, hemisférico al principio, luego de convexo a aplanado, no o apenas mamelonado; superficie lisa, sedosa,



brillante y...

Crece formando fascículos sobre las hojas de planifolios o coníferas, pero especialmente en bosques de hayas (*Fagus sylvatica*)...

Por [asturnatura.com](http://asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-damascenus.html>

## *Amegilla quadrifasciata* (de Villers, 1790)

Adultos de 9-12 mm de longitud, con la cabeza provista de unos grandes ojos compuestos y una gran probóscide. El tórax está densamente cubierto de una...

Los adultos se encuentran entre marzo y junio libando diferentes especies de plantas de las familias Labiatae, Boraginaceae y Primulaceae, en las cual...

Desde las islas Canarias por el oeste hasta Japón por el este, incluyendo el norte de África, gran parte de Europa central y meridional y Asia central...

Por [asturnatura.com](http://asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amegilla-quadrifasciata.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Brachinus sclopeta* (Fabricius, 1792) (Arthropoda)

*Carabus guadarramus* Laferté, 1847 (Arthropoda)

*Carabus violaceus* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

*Lepiota erminea* (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Lucilia caesar* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Russula velutipes* Velen. (Basidiomycota)

*Sphinctus serotinus* Gravenhorst, 1829 (Arthropoda)

