



Num. 552. Publicado el 25/10/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Viola riviniana*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 552. Publicado el 25/10/2015

Descripciones de especies

Spergula arvensis L.

Planta herbácea anual, con tallos de 5-70 cm, en general ascendentes, más o menos ramificados en la base, de moderada a densamente glandular-pubescent...

Mala hierba en campos de cereales y otros cultivos de secano, pastos alterados, etc., principalmente en suelos arenosos; calcífuga; 0-1400 m....

Subcosmopolita. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, enrareciéndose hacia el E, salvo en los alcornocales catalanes, donde abunda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spergula-arvensis.html>

Polygonum lapathifolium L.

Planta herbácea anual, con tallos de (10)30-70(80) cm, erectos o postrado-ascendentes, más o menos ramificados, por lo general engrosados en los nudos...

Mala hierba de jardines, alcorques, cultivos de regadío y especialmente de suelos húmedos o lechos fluviales; 0-1500 m. ...

Subcosmopolita. Difundida por la Península Ibérica; citada de Mallorca...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-lapathifolium.html>

Mycena fagetorum (Fr.) Gillet

Macroscopía. Sombrero de 12-24 mm, cónico, cónico-campanulado, tronco-cónico, ligeramente deprimido, higrófono, glabro, estriado por transparencia, de...

En hojas de *Fagus sylvatica*...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mycena-fagetorum.html>

Epilobium palustre L.

Hierba perenne, con sóboles filiformes -que suelen permanecer entre masasmusgosas-, de hasta 15 cm, con hojas escuamiformes distantes, amarillentas ...

Lugares húmedos, principalmente en substratos ácidos, tales como turberas, bordes de arroyo opastos encharcados de montaña; (0)1000-2500(2700) m....



Circumboreal: toda Europa -desde Islandia hasta Sierra Nevada-, gran parte de Asia -desde Anatolia hasta Kamtschatka y el Japón-, Groenlandia, y N de...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-palustre.html>

Agaricus porphyrocephalus F. H. Møller

Macroscopía. Sombrero de 45-65 mm, al principio cónico truncado o de hemisférico a convexo con el centro aplanado, que se expande hasta ser de convexo...

Vive solitario o formando pequeños grupos, en ocasiones en corros de brujas, de forma saprófita en prados o márgenes de cunetas en suelos pobres....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-porphyrocephalus.html>

Novedades corológicas

Hypsizygus tessulatus (Bull.) Singer (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 22/10/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hypsizygus-tessulatus-bull-singer-1/23483.html>

Inocybe flocculosa (Herink) Kuyper (Basidiomycota)

Nueva para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 23/10/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/inocybe-flocculosa-var-flocculosa-berk-sacc-1/23490.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abies pinsapo Boiss. (Pinophyta)

Cerastium diffusum Pers. (Magnoliophyta)

Codophila varia (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Euleia heraclei Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Hypsizygus tessulatus (Bull.) Singer (Basidiomycota)



Odezia atrata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Timandra comae Schmidt, 1931 (Arthropoda)

