



## Num. 553. Publicado el 02/11/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lygaeus equestris*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 553. Publicado el 02/11/2015**

## Descripciones de especies

### *Stachys alopecuros* (L.) Benth.

Planta herbácea de 18-60 cm, perenne, rizomatosa, con tallos con pelos sedosos, patentes o retrorsos. Hojas de 4-11,4 x 3,3-8,7 cm, cordiformes, de anc...

Matorral subalpino, claros de pinar y abetal, pastos, en substratos pedregosos calizos; 1030- 2200 m....

Montañas europeas y N de España, Pirineo central y occidental y montañas cantábricas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stachys-alopecuros.html>

### *Russula grisea* Fr.

Macroscopía. Sombrero de 50-80 mm de diámetro, hemisférico al principio, pronto aplanado y deprimido en el centro, ligeramente infundibuliforme y sinu...

Vive aislada o formando grupos en los bosques de planifolios y coníferas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-grisea.html>

### *Melanogaster variegatus* (Vittad.) Tul. & C. Tul.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de forma irregular, elipsoidal, reniformes, tuberiformes, subglobosos, de consistencia elástica y tenaz, de 2-5 cm de...

Hongo bastante común, a menudo semiepígeo, que crece en bosques de planifolios como Quercus, Corylus y Castanea desde la primavera al otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melanogaster-variegatus.html>

### *Lonicera etrusca* Santi

Arbusto trepador de (0,5)1-2(3) m. Tallos volubles, fistulosos, ramificados desde la base; ramas de corteza papirácea, glabra o glabrescente, grisácea...

Orlas y claros de encinares, melojares y quejigares en ambientes mediterráneos o submediterráneos, en todo tipo de substratos; 0-1600(1800) m....

Región mediterránea, SW de Asia y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias); a menudo cultivada como ornamental. Casi toda la Península...



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lonicera-etrusca.html>

## *Daphne mezereum* L.

Arbusto hasta de 1,5 m de altura. Tallos casi desnudos durante la floración; los del año, grisáceos o de un castaño claro, cubiertos de pelos de base...

Bosques -hayedos, abetales, pinares- y otros lugares de montaña frescos y más o menos umbrosos; 1000-2300 m. Ampliamente cultivado como ornamental....

Europa -excepto buena parte de la Península Ibérica-, SW y C de Asia, hasta el Altai. Pirineo -principalmente central y oriental-, Macizo del Montsen...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/daphne-mezereum.html>

## **Novedades corológicas**

### *Cortinarius callochrous* (Pers.) Gray (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 28/10/2015

Más información en

<http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-callochrous-subsp-callochrous-var-caroli-velen-nezdojm-1/23535.html>

### *Entoloma neglectum* (Lasch) Arnolds (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Selorio, Villaviciosa. ASTURIAS el día 01/11/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/entoloma-neglectum-lasch-m-m-moser-1/23571.html>

### *Inonotus cuticularis* (Bull.) P. Karst. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa Marina, Tineo. ASTURIAS el día 26/10/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/inonotus-cuticularis-bull-p-karst-1/23510.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Campanella caesia* Romagn. (Basidiomycota)

### *Cortinarius callochrous* (Pers.) Gray (Basidiomycota)

### *Cortinarius variicolor* (Pers.) Fr. (Basidiomycota)



*Cychrus spinicollis* Dufour, 1857 (Arthropoda)

*Entoloma neglectum* (Lasch) Arnolds (Basidiomycota)

*Eysarcoris venustissimus* (Schrank, 1776) (Arthropoda)

*Hyoscyamus albus* L. (Magnoliophyta)

*Paliurus spina-christi* Mill. (Magnoliophyta)

*Pistacia lentiscus* L. (Magnoliophyta)

*Rutstroemia sydowiana* (Rehm) W. L. White (Ascomycota)

