



## Num. 554. Publicado el 09/11/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Amanita strangulata*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 554. Publicado el 09/11/2015**

## Descripciones de especies

### *Russula fellea* (Fr.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 3-8 cm de diámetro, inicialmente globoso, después plano convexo, con el margen incurvado, acanalado; la cutícula es viscosa...

Crece en bosques de planifolios, generalmente de *Fagus sylvatica* y menos frecuentemente en coníferas, durante verano y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-fellea.html>

### *Ribes uva-crispa* L.

Arbusto de 0,5-1,5 m, espinoso, con tallos más o menos intrincados y provistos de aguijones casi siempre ternados. Hojas de (0,7)1-4(4,5) cm de anchura...

Matorrales bajo bosques caducifolios aclarados, ribazos, setos, espinares, barrancos umbrosos, roquedos; 700-2000 m....

Casi toda Europa, hasta Asia central (por el S, hasta el Himalaya), China y N de África (Marruecos y Argelia), cultivado y naturalizado en América bo...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ribes-uva-crispa.html>

### *Panaeolus papilionaceus* (Bull.) Quél.

Macroscopía. Sombrero de 15-28 mm de diámetro, más o menos hemisférico, más raramente cónico campanulado o campanulado, en ocasiones con un pequeño um...

Especie común, coprófila en estiércol de animales herbívoros, vaca y caballo principalmente....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/panaeolus-papilionaceus.html>

### *Cyperus esculentus* L.

Planta herbácea perenne, con un rizoma de casi 1 mm de diámetro, con escasas escamas pequeñas y estrechas, que emite abundantes raíces fibrosas; tubér...

Terrenos sueltos, húmedos, cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m....

Pantropical, que alcanza la región atlántica de Norteamérica y el Mediterráneo. Dispersa acá y allá por la Península....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-esculentus.html>

## *Asphodelus serotinus* Wolley-Dod

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, alargado y desprovistode restos fibrosos. Raíces con la parte proximal de mayor diámetro que la...

Claros de bosque -encinar, alcornocal, quejigar, melojar, eucaliptal y pinar-, matorral -jaral- y pastizales, taludes, en suelos poco desarrollados co...

Principalmente en el C y O de la Península Ibérica, más rara en el N...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-serotinus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Amanita dryophila* Consiglio & Contu (Basidiomycota)

*Amanita strangulata* (Fr.) Quél. (Basidiomycota)

*Calocoris roseomaculatus* (De Geer, 1773) (Arthropoda)

*Clytus rhamni* Germar, 1817 (Arthropoda)

*Creoleon lugdunensis* (Villers, 1789) (Arthropoda)

*Hemipenthes velutina* Meigen, 1820 (Arthropoda)

*Lasius flavus* (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

*Polyplax spinulosa* (Burmeister, 1839) (Arthropoda)

*Ranunculus sceleratus* L. (Magnoliophyta)

*Squamanita paradoxa* (A.H. Sm. & Singer) Bas (Basidiomycota)

*Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

