



## Num. 563. Publicado el 11/01/2016

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Chamaesyce peplis*. Por César Fernández González



**Num. 563. Publicado el 11/01/2016**

## Descripciones de especies

### *Viburnum tinus* L.

Arbusto de (1)2-4(5) m, erecto. Tallos ramificados desde la base, con ramas rectas, de corteza parda, provista de lenticelas verticales escasas, arru...

Formaciones forestales y preforestales de encinares, alcornoques y quejigares, con preferencia por los barrancos húmedos y abrigados, indiferente edá...

Región mediterránea. Áreas mediterráneas de la Península, especialmente abundante en su mitad meridional y en el E de España, esporádica en el N, y B...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/viburnum-tinus.html>

### *Lineus grubei* (Hubrecht, 1879)

Nemertino de hasta 15 cm de longitud y 5 mm de anchura. Cabeza no diferenciada de la parte anterior del tronco, bilobada. Con profundas hendiduras lon...

Intermareal o infralitoral hasta los 30 metros de profundidad, sobre fondos duros....

Esta especie fue descrita en Nápoles (Italia, Hubrecht, 1879). En la descripción original se citaban ejemplares recolectados en el Mar Adriático por G...

Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lineus-grubei.html>

### *Hypsizygus tessulatus* (Bull.) Singer

Macroscopía. Sombrero de 1.5-7 cm de diámetro, de pardusco a ocráceo. Láminas adnatas, de blanquecinas a gris parduscas, con la arista aserrada. Pie d...

Sobre madera caída....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypsizygus-tessulatus.html>

### *Cychrus spinicollis* Dufour, 1857

Escarabajo ibérico con una longitud de 16 - 20 mm. Su coloración general es negra. Cabeza larga y estrecha, provista de mandíbulas dentadas y con los a...



Viven principalmente en las zonas montañosas, en bosques húmedos. Son depredadores, especializados en la caza de los caracoles, de ahí la cabeza larga...

Se trata de una especie ibérica galaica-cantábrica...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cychnus-spinicollis.html>

## *Amanita dryophila* Consiglio & Contu

Macroscopía. Sombrero de 85-150 mm de diámetro, bastante carnoso, de convexo a plano convexo, apenas completamente expandido, con el margen estriado, ...

Crece en forma gregaria en el suelo de bosques de caducifolios, principalmente Quercus, en zonas calcáreas cálidas, durante el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amanita-dryophila.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Conus ventricosus* Gmelin, 1791 (Mollusca)

*Dolichovespula omissa* (Bischoff 1931) (Arthropoda)

*Galerina uncialis* (Britzelm.) Kühner (Basidiomycota)

*Helvella juniperi* M. Filippa & Baiano (Ascomycota)

*Ligustrum lucidum* W.T. Aiton (Magnoliophyta)

*Limonium angustibracteatum* Erben (Magnoliophyta)

*Pachynemia hippocastanaria* (Hübner, 1799) (Arthropoda)

*Thymelaea hirsuta* (L.) Endl. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

