



Num. 566. Publicado el 01/02/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Bryocentria hypothallina*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 566. Publicado el 01/02/2016

Descripciones de especies

Typha domingensis Pers.

Planta de 1-3 m, con hojas de longitud variable, que a veces sobrepasan la inflorescencia, carnosas; vainas foliares provistas de abundantes glándula...

Suelos húmedos, inundados o encharcados la mayor parte del año, en aguas de diferente tipo, desde dulces hasta subsalinas, está muy bien adaptada a lo...

Cosmopolita. Por toda la Península e Islas Baleares...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/typha-domingensis.html>

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori

Planta perenne, densamente cespitosa, con raíces fasciculadas, finas, hasta de 5(7) cm. Tallos de 10-25(35) cm, erectos, cilíndricos. Hojas de hasta 25...

Crestones venteados, pastos alpinos en terrenos pedregosos o crioturbados, preferentemente calcáreos. 1700-2800 (3000) m. ...

Ártico-alpina: Asia, América del N, Groenlandia e Islandia; Escandinavia, Alpes, Abruzzo, Tatra y Balcanes. Pirineos y Picos de Europa...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/kobresia-myosuroides.html>

Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst.

Macroscopía. Hongo que forma basidiomas anuales, pileados, generalmente en grupos imbricados. El sombrero es más o menos didimiado o plano convexo y a...

Crece de forma saprófita o parásita en diferentes planifolios durante todo el año....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inonotus-cuticularis.html>

Cortinarius callochrous (Pers.) Gray

Macroscopía. Sombrero de tamaño pequeño a medio, de 4-5 cm de diámetro, apenas carnoso, aplanado, con el margen un poco enrollado al principio pero lu...

Vive entre frondosas, en suelos neutros o algo básicos....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-callochrous.html>

Amaranthus hypochondriacus L.

Hierbas anuales, erectas, con tallos ligeramente pelosos en la parte superior. Hojas de 8-15(18) x 2-6(10) cm, generalmente ovales o algo lanceolados. I...

Ornamental, escapada de cultivo con relativa frecuencia....

Originaria de América del Norte, introducida como pseudocereal en Asia y como ornamental en gran parte del mundo. Naturalizada en la Península Ibéri...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amaranthus-hypochondriacus.html>

Novedades corológicas

Allantoporthes tessella (Pers.) Petr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Bustoburniego, Tineo. ASTURIAS el día 28/01/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/allantoporthes-tessella-pers-petr-1/24115.html>

Bryocentria hypothallina B. Nordén, Gardiennet, Priou & Döbbeler (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 31/01/2016

Más información en

<http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/bryocentria-hypothallina-b-norden-gardiennet-priou-dobbeler-1/24128.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Allantoporthes tessella (Pers.) Petr. (Ascomycota)

Bryocentria hypothallina B. Nordén, Gardiennet, Priou & Döbbeler (Ascomycota)

Caenoplana bicolor (Graff, 1899) (Platyhelminthes)

Coccinula quatuordecimpustulata Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Coelometopus clypeatus (Germar, 1813) (Arthropoda)



Exochomus nigromaculatus (Goeze, 1777) (Arthropoda)

Karstenia macer (P. Karst.) Sherwood (Ascomycota)

