



Num. 567. Publicado el 08/02/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dicyrtomina saundersi*. Por José Rafael González López



Num. 567. Publicado el 08/02/2016

Descripciones de especies

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.

Árbol de hasta 10 m con ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; cortezaescamosa, gris; yemas 5-9 mm, ovoides, subagudas, con 4-5 escamas g...

Robledales, fresnedas, saucedas y setos; en todo tipo de substratos; 500-1000 m....

W, C y S de Europa -desde Gran Bretaña y la Península Ibérica hasta Hungría-; y ¿NW de África? NE y C de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-latifolia.html>

Rumex crispus L.

Planta perenne, de hasta 1,3(2,5) m. Tallos uno o varios por pie, erectos, estriado-asurcados. Hojas basales (35)60-260(500) x (7)10-70(140) mm, oblong...

Pastos húmedos nitrificados, cunetas, ribazos, bordes de cursos de agua y medios frescos alterados, en general; 0-2000 m....

Subcosmopolita. Repartida por toda la Península Ibérica y las Batareas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-crispus.html>

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Árbol de hasta 100 m de altura y 440 cm de diámetro con la copa anchamente cónica que típicamente se vuelve aplanada o irregular con la edad; muchos d...

En España aparece como planta ornamental y en algunas repoblaciones en puntos del norte, noroeste y Sistema Central. ...

Originaria del O de Norteamérica, desde la Columbia Británica, en el suroeste de Canadá hasta la zona central de California, en el suroeste de Estados...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pseudotsuga-menziesii.html>

Pimelia baetica Solier, 1836

Coleóptero tenebriónido con una longitud de 17 a 20 mm, de cuerpo globoso y de coloración negra. En la cabeza, antenas con el tercer antenómero cuatro...



Especie típica de ambientes xerófilos....

Sur de la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pimelia-baetica.html>

Coris monspeliensis L.

Planta erecta, rara vez de porte almohadillado, con el tallo principal de (5)10-25(40) cm. Hojas de (2)4-9(20) x 0,4-1,2(2) mm, erecto-patentes o refl...

Romerales, tomillares y otros matorrales termófilos, en general sobre substrato básico; 0-1400(1700) m....

Región mediterránea europea y N de África. Por toda el área mediterránea de la Península Ibérica e Islas Baleares. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coris-monspeliensis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bibio pomonae Fabricius, 1775 (Arthropoda)

Bryocentria metzgeriae (Ade & Höhn.) Döbbeler (Ascomycota)

Dicyrtomina saundersi (Lubbock, 1862) (Arthropoda)

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) (Arthropoda)

Pimelia baetica Solier, 1836 (Arthropoda)

Sorbus latifolia (Lam.) Pers. (Magnoliophyta)

Tricharina ochroleuca (Bres.) Eckblad (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

