



## Num. 57. Publicado el 09/01/2006

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lapsana communis*. Por César Fernández González



**Num. 57. Publicado el 09/01/2006**

## Descripciones de especies

### *Tursiops truncatus* (Montagu, 1821)

Se trata del delfín más conocido, ya que presenta una distribución amplia y está presente en muchos acuarios. Mide hasta 4 m de longitud y tiene un pe...

Se encuentra en aguas no muy profundas, ya que tiene que subir a la superficie a respirar, pero puede llegar a sumergirse hasta 200 m de profundidad. ...

Se encuentra en aguas templadas y cálidas de todo el mundo, tanto en zonas oceánicas como mares cerrados, como el Mar Negro y el Mediterráneo. Vive en...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tursiops-truncatus.html>

### *Tritonia hombergi* Cuvier, 1803

Nudibranquio alargado, de unos 20 cm de longitud, de contorno ovalado y sección cuadrangular. El juvenil es de color blanco y al crecer pasa a tener m...

En aguas poco profundas, alimentándose de *Alcyonium digitatum* y en menor medida de Antennularia y ostras. Al ser molestado segrega un mucus que puede ...

Desde Noruega a la costa del Mediterráneo español....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tritonia-hombergi.html>

### *Trachinus draco* Linnaeus, 1758

Pez de unos 25 - 30 cm de longitud, a veces mayores, de cuerpo aplanado lateralmente y alargado, midiendo unas 6 veces la altura. En la cabeza son car...

En fondos de arena o fango hasta los 150 m, parcialmente enterrado, asomando sólo la parte superior de la cabeza y la boca y la aleta dorsal, acechand...

Desde Noruega a Marruecos, Canarias, Madeira, el Mediterráneo y el Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trachinus-draco.html>



*Rhodophyllis divaricata* (Stackhouse) Papenfuss

Alga roja de 2 a 15 cm de longitud, fijada al sustrato por un disco basal pequeño, que a veces desarrolla una corta estipe. La fronde, de color rojo o...

Sobre rocas, conchas, o en otras algas en el submareal....

Desde Noruega a Mauritania y el Mediterráneo. Australia y Nueva Zelanda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhodophyllis-divaricata.html>

*Phorbas fictitius* (Bowerbank, 1866)

Esonja incrustante o masiva-lobulada, de hasta 20 cm de longitud y 15 mm de grosor, con papilas ovaladas, donde se sitúan los poros inhalantes, dispu...

Sobre rocas y algas calcáreas, generalmente en zonas verticales y expuestas, hasta 25 - 30 m de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phorbas-fictitius.html>

*Emarginula fissura* (Linnaeus, 1758)

Lapa con forma de gorro, con el ápice recurvado hacia la parte posterior y con una abertura exhalante en el extremo. Tiene 10 mm de diámetro y 6 de al...

En aguas poco profundas, a 300 m de profundidad, sobre rocas, alimentándose de esponjas....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/emarginula-fissura.html>

*Diplecogaster bimaculata* (Bonnaterre, 1788)

Pequeño pez de hasta 5 - 6 cm de longitud, de cuerpo alargado y aplanado, cuyas aletas ventrales se encuentran formando una fuerte ventosa. La cabeza,...

En fondos mixtos de arena, piedras y conchas, desde aguas poco profundas a los 100 m de profundidad, alimentándose de organismos bentónicos. Se fija f...

Desde Noruega a Gibraltar y en el Mediterráneo oeste....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diplecogaster-bimaculata.html>



## *Caryophyllia inornata* (Duncan, 1878)

Pólipo solitario, de unos 5 - 12 mm de diámetro y 18 de alto, de sección transversal redondeada o ligeramente ovalada, con unos 80 tentáculos cortos te...

Sobre rocas, generalmente en zonas verticales poco iluminadas, como grietas, paredes de cuevas, salientes, desde 1 o 2 m de profundidad a 30 m, a vece...

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/caryophyllia-inornata.html>

## *Bolma rugosa* (Linnaeus, 1767)

Concha grande, de unos 5 o 6 cm de anchura y similar altura. Es sólida, bastante pesada y con 7 espiras abultadas, bastante esculpidas: en la parte su...

En zonas rocosas del sublitoral, camuflado con algas e hidrozooos. No muy frecuente....

Desde el Cantábrico al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bolma-rugosa.html>

## *Autolytus prolifer* (Müller, 1784)

Gusano poliqueto de hasta 15 cm de longitud, con unos 60 segmentos corporales. En la cabeza, redondeada, tiene 4 grandes ojos, 2 manchas oculares u oc...

Entre rizoides de algas, piedras, conchas, en aguas generalmente poco profundas....

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/autolytus-prolifer.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Acanthochitona fascicularis* (Linnaeus, 1767) (Mollusca)

*Anthyllis vulneraria subsp. iberica* (W. Becker) Jalas ex (Magnoliophyta)



*Funiculina quadrangularis* (Pallas, 1766) (Cnidaria)

*Merlangius merlangus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Ramaria stricta* (Pers.) Qué. (Basidiomycota)

*Trapania hispalensis* Cervera y García-Gómez, 1989 (Mollusca)

*Ulmus minor* Mill. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008